



Technische Universität Berlin FB 14
Institut für Landschafts- und Freiraumplanung
1 Berlin 10, Franklinstraße 29

1880. W. P. S. 1880

Verzeichniß

der

grösstentheils im Freien ausdauernden Stauden-Gewächse

einschliesslich der

Alpen-Pflanzen, Freiland-Farne,
sowie Freiland-Eriken

und einem Anhang über Erdbeerpflanzen,

welche

in den Gräflich Stolberg'schen Gärten

zu **Wernigerode a. H.**

gegen Kasse oder Tausch abgebbar sind.

Gefällige Aufträge wolle man richten an den Hofgärtner G. Eichler.

Wernigerode.

Druck von B. Angerstein.

Zur gefälligen Beachtung!

Die Preise verstehen sich per Kasse netto, in deutscher Reichswährung,
1 Mark = 1 Fr. 25 Cent. = 1 Schilling, Werthpapiere nach Cours.

Den Bestellungen bitte ich den Betrag beizufügen oder Nachnahme zu gestatten. Denjenigen unserer verehrlichen Geschäftsfreunde, für welche wir ein laufendes Konto führen, gewähren wir einen dreimonatlichen Kredit.

Briefe und Gelder werden franko erbeten. Emballage wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr der Besteller, doch wird für eine sorgfältige und sachgemäße Verpackung gesorgt.

Reklamationen können nur dann berücksichtigt werden, wenn dieselben spätestens 24 Stunden nach Empfang gemacht und genügend begründet werden.

Den Staudenfreunden möge zur gefälligen Nachricht dienen, daß fortan die größte Sorgfalt den einst sich eines bedeutenden Rufes erfreuenden Staudenkulturen zugewendet werden soll. Die Sortimente werden durchgängig revidirt, die Nomenclatur soweit thunlichst berichtigt.

Die neueren und besseren, ebenso auch die abhanden gekommenen älteren guten Stauden, sollen nach Kräften durch Tausch oder Kauf wieder beschafft werden, und werde ich für jede mir hierbei zu Theil werdende Unterstützung ganz besonders dankbar sein.

Das Verzeichniß über Stauden und einige andere Sämereien ist in Bearbeitung und wird noch vor dem ersten November erscheinen.

Die Verzeichnisse über Gewächshauspflanzen und Baumschul-Artikel werden später erscheinen.



Erklärung der Zeichen.

Die wenigen mit *T* bezeichneten Arten sind für unsere, sehr oft veränderlichen Winter etwas zärtlich, daher anzurathen, davon immer einige in Töpfen zu halten und möglichst frostfrei zu durchwintern. Mit *z* bezeichnete sind nur zweijährig und sterben in der Regel nach der Blüthe ab, daher dieselben jährlich aus Samen nachgezogen werden müssen. Die mit *Δ* versehenen sind entweder wirkliche Alpenpflanzen, oder solche, die sich zur Bepflanzung künstlicher Alpen oder Steinpartien eignen.

Die zu Einfassungen von Blumenbeeten u. geeigneten Pflanzen sind mit Schockpreisen versehen. Die Schock- und Duzendpreise gelten jedoch nur bei Abnahme von wenigstens $\frac{1}{2}$ Schock resp. $\frac{1}{2}$ Duzend, werden weniger verlangt, so treten die Stückpreise ein.

Um den Blumenfreunden die Auswahl einigermaßen zu erleichtern, sind die schönsten und vorzüglichsten Arten und Varietäten mit einem * versehen.

Diejenigen bei denen kein Preis bemerkt ist, können wegen mangelnder Vermehrung noch nicht abgegeben werden, der größte Theil derselben aber gewiß zum nächsten Herbst; die andern Ständen sind meist abgebar, soweit Vermehrung vorhanden, oder in der kurzen Zeit meines Hierseins sich beschaffen ließ.

Von fast allen Samen tragenden Pflanzen wird auch in jedem Frühjahr Samen abgegeben, und die Portien mit 10 Pfg. berechnet.

Bei größerem Bedarf für Wiederverkäufer stehen jedem Herbst Verzeichnisse mit 20-Grammpreisen zu Diensten, die Anfang Oktober abgefordert werden können.

	à St.	à Dtz.		à St.	à Dtz.
	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.
Acanthus , Acanthaceae			Acouitum , ochroleucum		
Bärenflau			Hort. f. Lycoctonum.		
T longifolius Poir.	50	—	orientale Mill.	20	—
lustanicus	—	—	pyramidale, = Napellus.		
T mollis L.	40	—	rubrum	30	—
niger Mill.	40	—	rhynchanthum Rchb., f.		
spinosissimus Desf.	40	—	variegatum.		
spinosus L.	30	—	Störkianum Rchb.	30	—
Aceranthus , Berberideae			tauricum Wulf., = Na-		
diphyllus Morr. Decais.	40	250	pellus.		
(Epimedium diphyll.)			unicinatum L.	20	100
Achillea , Compositae-			variegatum L.	20	100
Achilleae Garbe.			Vulparia Rchb., =		
Δ alpina L., siehe Ptarmica			Lycoctonum.		
alpina.			Willdenowii Rchb. =		
filipendulina Lam.	20	120	Napellus.		
* (Eupatorium Bbrst.)			Acorus , Aroideae, Rasmus		
lanata Lam. f. Ptarmica			Δ gramineus Ait. foliis		
nana.			variegatis	20	—
macrophylla L. f. Ptarmica			Actaea , Ranunculaceae,		
macrophylla.			Christopfskraut.		
* Millefolium L. flore rubro	20	100	Cimicifuga L.	30	—
myriophylla Willd.	20	—	pterosperma Turtsch.	40	—
* Ptarmica L. flore pl.	20	100	* racemosa L.	40	—
Für Bouquetbinderei sehr werthvoll			* spicata L.	40	—
Ptarmica grandiflora	20	—	Actinospora , dahurica		
sambucifolia Desf. siehe			Turtsch, = Actaea		
Pyrethr. macrophyllum.			pterosperma.		
Aconitum , Ranunculaceae,			Actinomeris , Compositae-		
Eisenhut.			Bidentes.		
Anthora L.	20	—	helianthoides Nutt.	40	—
dissectum Don.	20	—	Adenophora , Campanu-		
excellentissimum	20	—	laceae, Drüsenträger.		
Halleri Rchb. f. Napellus.			coronata Desf. fil.	30	—
illinitum Rchb. = va-			(campanula c Kerr. Dr.)		
riegatum.			denticulata Ledeb. =		
Lycoctonum L.	30	120	tricuspidata.		
Mielichhoferi Rchb., =			* elegans	40	—
Napellus.			Lamarikii Fish.	40	—
moldavicum Hacq., =			* liliifolia Ledeb.	40	—
Lycoctonum.			* stylosa Fisch.	40	—
Napellus L.	20	—	suaveolens Rchbch. =		
„ pyramidale Mill.	20	—	liliifolia	40	—
nemorosum Bbrst., =			tricuspidata Dec. fil.	40	—
Anthora.					

à St. à Dtz.
Pf. Pf.

Adenostyles, Comp.-Eu-
patoriæ, Drüsengriffel.
albifrons Rchbch = Pe-
tasites.
— alpina Blff. et Fngsch. 50 —
— Petasites Bluffet Fngsch. — —

Adlumia, Fumariaceæ.
— cirrhosa Rafin ♂ 30 —
(Corydalis fungosa Vent.)

Adonis, Ranunculaceæ,
Adonisröschen
* vernalis L. . . . 30 150

Agrimonia, Rosaceæ
Odermennig.
— caffra 30 —
— repens L. . . . 30 —

Agrostemma, Caryophyl-
leæ, Rade.
— coronaria L. ♂ . . 20 60
— „ flore albo ♂ 20 60
— „ bicolor ♂ 20 60
Weiß mit rothem Auge, schön.
— flos Jovis L. . . 30 —

Ajuga, Labiatae, Gänsef.
— reptans L. fol. purpureis 10 60
Sehr hübsch, zu Winter-Typisch-
beeten verwendbar.

Alechemilla, Rosaceæ,
Frauenmantel.
Δ alpina L. . . . 30 —
Δ pubescens Bbrst. . 30 —

Allium, Alliæ, Lauch.
— carinatum L. . . . 20 —
* coerulescens Don. . 40 —
(azureum Ledeb.)
* Moly L. . . . 20 50

Althæa, Malvaceæ,
Eibisch, Malve.
— narbonnensis Pourr. Cav. 20 —
— rosea Cav. ♂ flore pleno — —
— Charteri, Chartersche Preis-
malven in folgenden Sorten:
— alba grandiflora
— argentea

à St. à Dtz.
Pf. Pf.

Countess of Russel
Cramy white
Emmeline
James Allaun
Imperator
Isabellina
Lady Clark
Miss Lizzie King
Mr. Charter
Minerva
Non plus ultra
Othello
Rosea pallida
Safrano
Standard rival
Syrian Prince.

Jede d. vorstehenden Sorten à 20 200

Die Charterschen Preismalven
sind anerkannt das vollkommenste
unter den gefüllten Malven.

Alyssum, Cruciferae.
* Wierzbickii Heufel . 30 —
— saxatile L. compactum 20 —

Amsonia, Apocynæ.
— angustifolia Michx. 30 —
— latifolia Michx. . . 40 —
— salicifolia Pursh. . 30 —

Anchusa, Boraginæ,
Dschenzunge.
— azurea Mill. = paniculata.
— officinalis L. . . . — —
— „ incarnata . 20 120

T paniculata Ait. ♂ 30 —
— sempervirens L. . . — —
(Omphalodes semperv.
Don.)

Androsaemum, Hyper-
cineæ.
— officinale All. . . 30 —
(Hypericum Androsam.)

Anemone, Ranunculaceæ,
Windröschen.
— aconitifolia Michx., siehe
— pensylvanica.
— alba Juss. . . . 30 —

	à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.
Δ <i>Anemone</i> , alpina L. siehe		
<i>Pulsatilla alpina</i> .		
T* <i>coronaria</i> L.	5	50
<i>flore pleno</i>	10	100
<i>Garten-Anemone</i> in		
<i>Pracht-Varietäten</i> .		
<i>japonica</i> Zucc.	30	250
<i>flore albo</i>	40	—
(<i>Honorine Jobert</i>).		
<i>elegans</i>	—	—
<i>hortensis</i> = <i>stellata</i> .		
<i>hybrida</i>	30	250
<i>montana</i> Hoppe siehe		
<i>Pulsatilla mont.</i>		
<i>multifida</i> Poir.	30	—
Δ <i>narcissiflora</i> L.	50	—
<i>Sehr distinkte alpine Species.</i>		
* <i>nemorosa</i> L. fl. albo pl.	20	80
<i>ochotensis</i> Fisch = <i>alba</i>	—	—
<i>pennsylvanica</i> L.	30	—
<i>Pulsatilla</i> L. f. <i>Pulsatilla</i>		
<i>vulgaris</i> .		
<i>stellata</i> Lam.	10	100
* <i>sylvestris</i> L.	20	80
<i>Antennaria</i> , <i>Compositae</i> .		
<i>Gnaphaliceae</i> .		
<i>dioica</i> Gärt.	5	50
<i>Beliebte Teppichpflanze zuzier-</i>		
<i>lichen Linien, auch für Winter-</i>		
<i>teppichbeete sehr zu empfehlen.</i>		
<i>Anthemis</i> , <i>Compositae</i> , <i>Ramisse</i> .		
<i>rigescens</i> Willd.	20	—
<i>flore albo</i>	—	—
<i>Anthericum</i> , <i>Asphodeleae</i> ,		
<i>Jaunflie</i> .		
* <i>graminifolium</i> Willd.	20	—
* <i>Liliago</i> L.	20	120
* „ <i>varietas Benaryi</i>	30	—
* <i>Liliastrum</i> L. f. <i>Czackia</i> .		
* <i>ramosum</i> L.	20	120
<i>Antirrhinum</i> , <i>Scrophula-</i>		
<i>riaceae</i> , <i>Sönnenmaul</i> .		
Δ <i>Cymbalaria</i> L., siehe		
<i>Linaria Cymb.</i>		
<i>majus</i> in <i>Prachtvarietäten</i>	10	100
<i>m. Tom Thumb</i> , doi.	10	100

	à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.
<i>Antirrhinum</i> , <i>pilosum</i> L.		
siehe <i>Linaria pilosa</i> .		
<i>Apocynum</i> , <i>Apocynaceae</i> ,		
<i>Sundswolle</i> .		
* <i>androsämisfolium</i> L.	40	—
<i>Bekannt als Fliegenfänger, ge-</i>		
<i>hört zu den feinsten und lange</i>		
<i>blühenden Stauden.</i>		
<i>venetum</i> L.	40	—
<i>salicifolium</i> R. Willd.	40	—
<i>Aquilegia</i> , <i>Ranunculaceae</i> ,		
<i>W efei</i> .		
<i>arctica</i> Hort. Loud.	40	—
* <i>canadensis</i> L.	20	—
<i>„ elatior</i>	20	180
* <i>Durandi</i> fl. pl. gestreift	30	—
* <i>jucunda</i> Fisch et Lallém.	50	—
<i>nivea</i> Baumg.	30	—
T* <i>Skinneri</i> Hock	30	—
* <i>sibirica</i> Lam.	20	100
<i>flore carneo pleno</i>	80	—
<i>„ „ rubro pleno</i>	60	—
<i>Arabis</i> , <i>Cruciferae</i> , <i>Gänse-</i>		
<i>frant</i> .		
<i>alpina</i> L. <i>foliis variegatis</i>	30	—
Δ <i>bellidifolia</i> L.	20	—
<i>Aralia</i> , <i>Araliaceae</i> , <i>Berg-</i>		
<i>angelika</i> .		
<i>cashemirica</i> Royle	100	—
<i>macrophylla</i> Lindl.	100	—
<i>racemosa</i> L.	100	—
<i>Die Aralier sind dekorative Blatt-</i>		
<i>pflanzen und einzeln auf Rasen-</i>		
<i>sehr verwendbar.</i>		
<i>Arenaria</i> , <i>Caryophylleae</i> ,		
<i>Sandfraut</i> .		
Δ <i>balearica</i> L.	20	—
<i>Neußerst zierlich.</i>		
<i>Armeria</i> , <i>Plumbagineae</i> ,		
<i>Grasnelke</i> .		
<i>alpina</i> Willd.	20	—
<i>angustifolia</i>	20	—
<i>dianthoides</i> Hornem.	20	—
<i>Halleri</i> Wallr.	30	—
<i>maritima</i> Willd.	10	30

	à St.	à Dtz.
	Pf.	Pf.
Armeria, maritima flore		
purpureo	20	80
maritima Lauchena	20	—
plantaginea Willd.	30	—

Arundinaria, Bambusae.		
japonica Sieb.	50	—
(Bambusa Metake Vilm.)		

Hält in Norddeutschland unter Decke gut aus und bildet breite ornamentale Büsche; auch als Kalthauspflanze sehr dekorativ.

Artemisia, Compos. - Anthemideae, Beifuß.		
Abrotanum L. Eberwurz	20	—
Absinthium L. Wermuth	20	50
Dracunculus L. Esdragon	20	50
Ludoviciana Mitt.	20	—
Stelleriana	10	100

Als Teppichpflanze durch den niedrigen Wuchs und die silbergraue Belaubung sehr geschätzt, auch in den Rand niedriger Bosquets gepflanzt, effektiv, winterhart.

repens Pall.	20	—
Arum, Aroideae, Aronswurz.		
Arisarum L.	30	—
italicum Mitt. Lam.	30	—
maculatum L.	20	80

Asarum, Aristolochiae, Haselwurz.		
canadense L.	40	—
europaeum L.	20	—

Asclepias, Asclepiadeae, Schwalbenwurz.		
consanguinea Knze.	50	—
Douglasii Hook.	50	—
princeps Barth	40	—
* tuberosa L.	50	—

Mit prachtvollen leuchtend orangefarbenen Blüthendolden, eine der effektivsten Staude überhaupt, verlangt sandigen Boden.

Asperula, Rubiaceae, Waldmeister.		
Δ laevigata L.	20	—

	à St.	à Dtz.
	Pf.	Pf.
Δ Asperula, odorata L.	20	—
Echter Waldmeister, zum Mattraunk sehr gesucht.		

Asphodelus, Asphodeleae, Affodill.		
albus Willd.	50	—
luteus L.	30	150
„ flore pleno	30	200
ramosus L.	50	—
tauricus Pall.	40	—

Aster, Compositae - Astereae, Sternblume.		
--------------------------------------------------	--	--

Δ* alpinus	10	50
* Amellus L.	20	100
* amelloides Bess.	20	100
bicolor	20	—
concolor L.	20	—
cyaneus Hoffm.	20	—
diffusus Ait.	20	—
ericoides L.	20	—
foliosus Ait.	20	—
fragilis, Willd.	20	—
mollis	20	—
* Novae Angliae L.	20	—
* „ „ fl. roseo	20	—
* „ „ fl. rubro	20	—
* Novi Belgii L.	30	—
* pendulus Ait. (horizontalis Desf.)	30	—
recurvatus	20	—
serotinus Willd.	20	—
spurius Willd.	—	—
Novae Angliae.		

Astragalus, Papilionaceae, Tragant.		
falcatus Lam.	20	—
galegiformis L.	20	—
glyciphylloides Dec.	20	—
leucophaeus Sm.	30	—

Astrantia, Umbelliferae, Sternbolbe.		
alpina	—	—
Biebersteinii Fisch. Mey.	40	—
Δ carniolica Jacq.	40	—
caucasica Willd. Spr.	—	—

	à St. à Dtz.		à St. à Dtz.
	Pf. Pf.		Pf. Pf.
Astrantia , Epipactis L., siehe Haquetia Ep.		Anna, Adelaide, Adele, Ade- laide Stoperford, Antoinette, Francisca, Highländer, La- tona, Orestes, Prince of Wales, Purple, Malvina, Susanna	10 100
* helleborifolia Salisb.	20		
intermedia Bbrst. siehe caucasica.		Betonica , Labiatae, Behr- frant.	
Blüthen von allen species originell.		* grandiflora Stev., siehe Stachys grandiflora.	
Aubrietia , Cruciferae.		orientalis L., f. Stachys longifolia.	
Campbelli.		serotina Host., siehe Stachys Betonica.	
Δ Columnae Guss.	30	stricta Ait., siehe Stachys Betonica.	
Δ deltoidea Dec.	20 150	Bidens , Compositae.	
„ purpurea	— —	atrosanguinea	30 100
Δ erubescens Griesb.	30 —	Biebersteinia , Zygophylleae, Orphanidesi	
Δ Graeca fol. var.	— —	Biotia , Compositae-Astereae.	
Δ purpurea siehe deltoidea	— —	corymbosa Dec.	20 —
Δ spathulata	— —	(Aster corymbosus Ait.)	
Reizende Einfassungspflanzen.		Bocconia siehe Macleya.	
Balsamita , vulgaris Willd., — f. Pyrethrum Tanacetum.		Buphthalmum , Compo- sitae, Ochsenzunge.	
Bambusa , Bambusaceae, Bambus.		cordifolium Waldst. Kit. f. Telekia cordifolia.	
T* Fortunei v. Houtte	50 —	grandiflorum L.	20 150
Metake f. Arundinaria.		var. salicifolium L.	30 —
Baptisia , Papilionaceae.		Bupleurum , Umbelliferae Häfenohr.	
* australis R. Br.	30 —	longifolium L.	20 —
* exaltata Sweet	40 —	Cacalia , Compositae-Ja- cobeae.	
* leucantha	50 —	suaveolens L.	30 —
* perfoliata R. Br.	50 —	Calliopsis , Comp Amphi- ceniantae, Schöngesicht.	
Die Baptisien müssen mehrere Jahre an einer Stelle verbleiben ehe sie ihre große Schönheit ent- falten.		Atkinsoniana Hook.	20
Barnardia , Asphodeleae. scilloides Lindl	50 —	Caltha , Ranunculeae, Dotterblume.	
(Ornithogalum chinense Lour.)		* palustris L. flore pleno	20 130
Bellis , Compositae-Aste- reae, Tausendschön.		* „ grandiflora fl. pl.	30 240
perennis L., weiß, roth, dunkelroth, zweifarbig, weiß in Lila übergehend	50	Calluna , f. Freiland-Grisen.	
perennis var. aucubae folia flore pleno	100		
perennis var. minor. weiß in Lila übergehend, rosa fistulirt, dunkelrosa	50		

à St. à Dtz.
Pf. Pf.

à St. à Dtz.
Pf. Pf.

Calystegia, Convolvulaceae, Bärwinde.

dahurica Fisch f. Convolvulus davuricus Lindl.
pubescens Lindl. fl. pl. 20 150

Prächtige gefüllte Winde

Doria incarnata . . . 30 200

(Convolvulus Doria incarnata, Catalog. Booth. 30 —

Campanula, Campanulaceae, Glockenblume.

* carpatia L. fil. . . 20 150

* „ flore albo 30 240

Beide ausgezeichnet zu Einfassungen.

eximea 3 . . . 20

* gummifera Willd. =

sarmatica.

lactiflora Bbrst. . . 30 —

* lamifolia Bbrst. . . 40 —

* latifolia L. . . . 30 180

* „ eriocarpa . . 30 180

* „ flore albo . . 30 180

Δ lilifolia Lam., f. Adenophora Lamarkii.

* macrantha Fisch = latifolia.

* Medium L. calycanthema 30 —

* „ flore albo 30 —

* nobilis Lindl. . . 30 180

* pulla L. . . . 20 50

* pusilla Hænke . . 20 —

„ flore albo . . 20 8)

„ pallida . . 30 —

* pyramidalis L. . . 30 —

„ flore albo 50 —

rotundifolia L. solda-

nelliflora plena . . —

* sarmatica Ker. . . 30 —

Trachelium L. . . 20 100

„ flore pleno 30 180

Carex, Cyperaceae, Segge.

australis foliis variegatis 20 —

Catananche, Compos.

Cychoeae, Rasselblume.

coerulea L. . . . 20 120

Catananche, coerulea

flore albo (bicolor) 20 120 *

Centaurea, Comps. Carduaceae, Glockenblume.

calocephala Willd. . . 30 —

(atropurpurea W. K.)

dealbata Willd. . . 30 —

flava . . . — —

glastifolia L. . . . 30 —

montana L. . . . 20 80

„ flore albo 20 100

nigrescens Willd. . . 20 100

sibirica L. . . . 20 —

Centranthus, Valerianae.

* ruber Dec. . . . 20 100

(Valeriana rubra L.)

* ruber flore albo . . 20 100

* „ flore coccineo 20 120

Cephalaria, Scabiosae.

alpina R. S. . . . 30 —

(Scabiosa alpina L.) — —

centauroides R. S. . 30 —

(Scab. centaur. Lam. Dr.)

Cerastium, Caryophylleae,

Sornfrant.

Biebersteinii Dec. . 15 —

Δ grandiflorum W. K. . 30 —

repens L. . . . 20 —

Δ tomentosum Dec. . 15 120

Chelone, Scrophularineae,

Schildblume.

T* barbata Cav. . . . 30 —

* obliqua L. . . . 30 180

Chrysanthemum.

indicum L., in nachste-

henden vorzügl. Sorten.

Soeur Melanie, reinweiß.

Mad. de Soulage, feurigroth.

Plantagenes, feurig amarant.

La Nympe, rosa.

Louis Barthere, dunkelpurpur.

Proserpine, niedrig, brillant gelb.

	à St. à Dtz.	Pf.	Pf.
Chrysocoma.			
* Linosyris L., siehe Linosyris vulgaris.			
Cimicifuga.			
foetida L., siehe Actaea Cimicifuga.			
Cineraria.			
macrophylla, (argentea) f. Ligularia macrophylla.			
Clematis, Ranunculaceae.			
Walbrebe.			
augustifolia Jacq.	20	100	
campaniflora Brot.	30	—	
corymbosa Poir. = erecta			
crispa L.	30	—	
cylindrica Sims.	30	—	
erecta All.	20	100	
Gebleriana Bongd.	40	—	
glauca Willd.	40	—	
* Hendersonii Hort.	40	—	
„ variegata	40	—	
hybrida	30	—	
„ hispanica	30	—	
integrifolia L.	—	—	
lasiantha Fisch. = angustifolia.			
lathyrifolia Bess.	30	—	
orientalis L.	50	—	
ochroleuca Ait.	50	—	
Pallasii Gmel. = angustifolia.			
pavrisiflora Dec.	30	—	
(revoluta Hor. Par.)			
Schillingi	40	—	
songarica Siev. = glauca			
stricta Wender	40	—	
„ thyrsiflora	40	—	
tubulosa Turcz.	50	—	
Vitalba L.	20	100	
* Viticella L.	30	—	
„ flore rubro	30	—	
* Viorna L.	40	—	
verticillaris Dec.	30	—	
Codonopsis, Campanulaceae.			
* lurida	30	300	

	à St. à Dtz.	Pf.	Bf.
Colchicum, Colchiceae.			
Herbstzeitlose.			
autumnale L.	20	80	
„ flore albo	20	—	
* „ flore pleno	50	—	
* byzantinum Gawl.	40	—	
patens Schz. = autumnale.			
* variegatum L.	40	—	
Sehr schön schachbrettartig gezeichnet.			
Commelina, Commelineae.			
coelestis Willd.	20	60	
„ flore albo	20	—	
„ foliis variegatis	20	—	
Convallaria, Smilaceae.			
Maiblume.			
* bracteata Thomas.	30	200	
gigantea	—	—	
latifolia Jacq.	40	—	
majalis L.	10	50	
„ marginata	20	100	
„ flore pleno	20	100	
„ flore roseo	20	100	
„ foliis striato variegatis	20	100	
* multiflora L.	20	150	
„ flore roseo	20	—	
Polygonatum L.	20	—	
* „ flore pleno	20	180	
stellata L. f. Smilacina stellata.			
verticillata L.	30	—	
Convolvulus, Convolvulaceae, Winde.			
davuricus Sims.	20	80	
* Doria incarnata, Cat. Booth., f. Calystegia.			
T* mauritanicus	40	—	
Eine prächtige Ampelpflanze die frostfrei überwintert werden muß.			
Coreopsis, Comp. Amphicniantae, Wanzenblume.			
* auriculata L.	40	—	
Atkinsoniana Dougl., f.			
Calliopsis Atkinsoniana,			

	à St.	à Dtz.
	Pf.	Pf.
Coreopsis , lanceolata L.	30	—
philadelphica	30	—
Coriaria , Coriariae.		
<i>T</i> myrtifolia L. . . .	40	—
Corydalis , Fumariaceae,		
Hohlwurz.		
bulbosa Pers. . . .	10	50
„ flore albo . . .	10	50
* capnoides Pers. . . .	30	—
Cucullaria Pers., siehe		
Dicentra C.		
fungosa Vent. siehe Ad-		
lunia cirrhosa.		
* lutea Dec. = capnoides.		
* nobilis Pers. . . .	40	360
* spectabilis Pers., siehe		
Dicentra sp.		
Cousinia , Comp. Cynareae.		
Hystrix Meyer . . .	30	—
(Carthamnus pterocau-		
lon Meyer).		
Crambe , Cruciferae.		
cordifolia Steven. .	30	—
Crocus , Croci.		
iridiflorus Heuff. .	20	—
sativus L.	20	—
vernus Smith	—	30
Crucianella , Rubiaceae,		
Kreuzblatt.		
* stylosa Trin.	30	180
* purpurea	30	—
Reizend zu Einfassungen.		
Cyclamen , Primulaceae,		
Alpenveilchen.		
Δ* Coum Mill.	—	—
Δ* europaeum L. . . .	40	—
Δ* hederæfolium Ait. .	—	—
(C. neapolitanum Tenor.)		
Δ* latifolium Smith. =		
(C. hederæfolium Sibth.)		

	à St.	à Dtz.
	Pf.	Pf.
Δ* Cyclamen , repandum Sibth.		
= (C. ficifolium Hort.)		
Vorstehende Alpenveilchen halten unsern Winter unter einer Moosdecke im Freien aus und sind sehr empfehlenswerth. Die Kultur hat keine Schwierigkeiten wenn man ihnen einen schattigen Stand und Halde- oder halbverrottete Laub-erde oder eine Mischung beider giebt, doch gedeihen sie auch im Lehmboden. Die Knolle dieser Arten werden 2 Zoll tief gelegt.		
C. repandum und C. latifolium blühen im März, latifolium, hederæfolium und europaeum blühen im Späthommer.		
Cynanchium , Asclepiadeae, Hundswürger.		
fuscatum Link	30	—
nigrum Pers.	30	—
Vincetoxicum Pers. . .	20	100*
Cypripedium , Orchideae, Frauenschuh.		
Calceolus L.	40	—*
spectabile Sw.	—	—
Czackia , Asphodeleae.		
Liliastrum Andr. . . .	30	180
Prächtige große weiße Blume.		
Datisca , Daphniphyta.		
cannabina L.	—	—
(Cannabis laevis Spr.)		
Delphinium , Ranunculaceae, Rittersporn.		
* bicolor Nutt.	30	—
* formosum Hort. . . .	20	—
* magnificum	50	—
* nudicaule	40	—
Prächtig, mit scharlachrothen Blüten.		
Dentaria , Cruciferae,		
Zahnwurz.		
Δ digitata Lam.	40	—
Δ polyphylla Waldst. K.	50	—

	à St.	à Dtz.		à St.	à Dtz.
	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.
Desmodium, Papilionaceae, Fesselhülse.			Dictamnus, albus fl. rubro	40	—
canadense	—	—	angustifolius Sweet	40	—
Dilleni	—	—	caucasicus	50	—
penduliflorum	50	—	davuricus	50	—
Ist im Spätherbst mit reifen Schmetterlingsblumen überdeckt.			Fraxinella Pers. = alba.		
Dianthus, Caryophylleae, Nelke.			Digitalis, Scrophularineae, Fingerhut.		
* barbatus L.	—	—	* Buxbaumii	30	—
* „ flore pleno	20	50	* ferruginea L.	30	—
* Caryophyllus L. fl. pl. beste Landnelken in Rommel	20	150	* gigantea	30	—
caryoph. semperflorens flore pleno			lutea L.	20	—
Remontirende Topfnelken.			maculata Iveryana	20	—
Grenadier	—	—	purpurea L.	20	—
Souvenir de Malmaison	—	—	„ flore alb.	20	—
Sämlinge, Rommel	10	100	Digraphis, Gramina, Mißgras.		
* chinensis L. flore pleno	10	50	arundinacea (L.) Trin.	10	100
deltoides L.	20	100	foliis variegatis	10	100
giganteus d'Urville	20	100	(Phalaris arund.)		
* hybridus Anna Boleyn	30	240	Dioscorea, Dioscoreae, Yamswurzel.		
* „ Gabriele fl. pl.	30	—	Batata D. C.	60	—
plumarius L. flore pleno	—	—	villosa L.	60	—
„ scotticus fl. pl.	—	—	Die Dioscoreen sind schnell wachsende Schlingpflanzen welche sehr zu empfehlen.		
Schottische Federnelken.			Diplostegium, Comp. Astereae, Doppelkranz.		
Agamemnon			umbellatum Dec.	20	100
Charles X.			Dodecatheon, Primulaceae, Götterblume.		
Grand duc.			Δ* Meadia L.	50	—
König von Sachsen.			Δ* „ flore albo	50	—
Königin der Schotten.			Δ* integrifolia	60	—
Mrs. Maclean.			Δ* mancastriense	60	—
Mr. Hoyle.			Dracocephalum, Labiatae, Drachenkopf.		
Von diesen Varietäten erlasse das Stück mit 20 Pfg., 1 Duzend mit 1,5 Mark.			* Ruyschiana L.	30	—
Dicentra, Fumariaceae.			* virgineanum L. f. Phytostegia virg.		
Cucullaria L (Corydalis C.)	30	—	Dryas, Rosaceae, Waldgöttinfräulein.		
spectabilis Dec. (Corydalis spect.)	40	—	T Drummondii Richards	80	—
spectabilis flore albo	40	—	octopetala L.	—	—
Dictamnus, Rutaceae, Diptam.					
albus L.	40	—			

	à St	à Dtz.
	Pf.	Pf.
Echinopus , Comp. Echino- podeae, Kugeldistel.		
bannaticus Rochel . . .	30	—
* cornigerus Dec. . . .	30	—
* horridus Desf. . . .	40	
* niveus Wall. . . .	30	—
* Ritro L. . . .	30	—
ruthenicus	30	—
sphaerocephalus L. . .	20	—

Elymus , Gramina, Strand- gerste.		
arenarius L. . . .	20	50
(Hordeum arenarium Aschs).		

Zum Befestigen von Flußsand
vorzüglich geeignet, aber auch we-
gen der silbergrauen Belaubung
effektvoll auf Rasen.

Epilobium , Onagraceae, Weidenröschen.		
* angustifolium L. . . .	20	100
„ flore albo	20	100
Dodonaei Vill. . . .	30	—
(angustissimum Ait.)		

Epimedium , Berberideae, Sockelblume.		
* alpinum L. . . .	20	150
Gelb mit braunem Saume.		
* diphyllum Lodd., siehe Aceranthus diphyllus.		
* erectum	40	250
* macranthum Lindl. . .	40	250
Weiß groß lumig		
* Muschianum Morr. et Dec. . . .	40	250
* pinnatum Fisch. . . .	50	300
Gelb, großlumig, sehr früh		
* violaceum Morr. et Dec. .	50	300
Rosa, sehr groß und früh.		

Eranthis , Ranunculaceae, Frühlingsblume.		
hyemalis Salisb.		
(Helleborus h.) . . .	30	200

Erica, f. Freiland-Ersten.

	à St	à Dtz.
	Pf.	Pf.
Erigeron , Comp.-Aster- vidae.		
speciosus Dec. . . .	20	120
(Stenactis speciosa Lindl.)		

Erinus, Scophularineae,
Leberbalsam.

Δ* alpinus L. . . .	30	—
---------------------	----	---

Eriogonum , Polygonaceae.		
flavum Mitt. . . .	30	—
(sericeum Pursh.)		

Erodium , Geraniaceae, Reiher Schnabel.		
T malacoides Willd. . .	30	—

Eryngium , Umbelliferae, Mannstreu.		
alpinum L. . . .	50	—
„ paleaceum (fl. p.) . .	80	—
campestre L. . . .	30	—

Erythronium , Coronariae, Liliaceae.		
Δ* dens canis L. . . .	20	150
Δ* „ „ flore albo . . .	30	—

Eupatorium , Comp. Eu- patoria, Waldost.		
altissimum L. . . .	30	—
* aromaticum L. . . .	30	180
corsicum	30	—
syriacum Jacq. . . .	30	—
variifolium Bart. . . .	40	—

Euphorbia , Euphorbiaceae, Wolfsmilch.		
Lathyris L. . . .	—	—
palustris L. . . .	30	—

Euryangium , Umbelliferae Sumbul, Moschuswurz . . .	—	—
Verühmtes Mittel gegen die Cholera, weshalb sie in die Phar- macopaea Großbritanniens aufge- nommen ist.		

Ferraria , Irideae, Pfaueniris.		
Tigridia Curt. . . .	20	200

Bekannte Frachtblume; die Dauer
der großen Blüten ist zwar nur ein-
tägig, sie werden aber durch täg-
lichen Nachwuchs ersetzt.

	à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.
Festuca, Gramina, Schwiegel.		
glauca Lam. Schrader	10	100
heterophylla Haenk.	20	100
F. glauca ist für Teppichbeete ausgezeichnet.		
Ficaria, Ranunculaceae, Scharbockkraut.		
ranunculoides Moench		
flore pleno . . .	50	—
(Ranunculus Ficaria L.)		
Fragaria, Rosaceae, Erd- beere.		
indica Andr. . . .	10	100
Gefällige Ampelpflanzen von fesselnder Schönheit, auch zur Be- kleidung von Felspartien ausge- zeichnet.		
Fritillaria, Coronariae, Becherblume.		
* imperialis L. Kaiserkrone	20	100
* „ fl. luteo . . .	20	100
* „ foliis argent. variegatis	50	—
Meleagris L. . . .	10	100
In diversen Varietäten		
Fumaria, siehe Corydalis und Dicentra.		
Funkia, Hemerocallideae.		
* cucullata Hort. . . .	—	—
* „ fol. alb. marginatis	30	—
* grandiflora Sieb et Zucc.	50	—
* lancifolia Sprgl. . . .	30	—
* margiata Hook. . . .	30	—
* japonica foliis luteo- viride marginatis.	30	—
* ovata Sprgl. . . .	30	250
(Hemerocallis coerulea Gawl.)		
* subcordata Sprgl. . .	40	360
(Hemerocallis alba Andr.)		
* undulata foliis elegans- variegatis O. et D.	30	300

	à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.
Gaillardia, Comp.-Heli- antheae.		
aristata Pursh. . . .	20	100
* bicolor	20	100
lanceolata Michx. . .	20	100
Richardsoni Penni. . .	20	120
Galanthus, Coronariae, Schneeglöckchen.		
Imperati	—	—
Δ nivalis L. 100 St 150 M	—	50
Δ „ flore pleno . . .	20	100
Δ plicatus Bbrst. . . .	40	—
Galatella, Com. Astereae.		
cana Nees. . . .	20	—
(Aster canus W. K.)		
hyssopifolia Nees. . .	20	100
(Aster hyssopifolium L.)		
linifolia Nees. . . .	30	—
(Aster linifolia L.)		
multiradiata	20	100
punctata Dec. . . .	20	100
(A. punctatus W. K.)		
rigida Cassin. . . .	40	—
virgata	30	—
Galega, Papilionaceae, Gaiskraute.		
officinalis L. . . .	20	80
flore albo	20	100
biloba Sweet	20	100
orientalis Lar. . . .	20	100
Galium, Rubiaceae, Reb- kraut.		
Δ purpureum L. . . .	30	—
Gardoquia, Labiatae.		
elliptica R. P. . . .	30	—
(Stachys speciosa Hook.)		
Genista, Papilionaceae, Ginster.		
sagittalis L. . . .	50	—
Gentiana, Gentianeae, Enzian.		
Δ* acaulis L. . . .	10	50
blühbare Büsche . . .	30	300
Δ asclepiadea L. . . .	—	—

	à St. à Dtz.			à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.
Gentiana,			Gratiola, Scrophulariaceae,		
Δ asclep. flore albo	60	—	Guadenfraut.		
Δ lutea L.	—	—	Δ officinalis L.	30	—
Geranium, Geraniaceae,			Gypsophila, Caryophyl-		
Storchschnabel.			leae, Gypsfrant.		
aconitifolium Herit.	40	—	* paniculata L.	30	—
Endressi Gay	40	—	Hablitzia, Chenopodiaceae.		
ibericum Cav.	50	—	tannoide; Marsh Bbrst. 60	—	
macrorrhizum L.	40	—	Schlingpflanze.		
prostratum Cav. siehe			Haquetia.		
sanguineum.			Epipactis	30	240
pratense L.	30	—	(Astrantia Epip)		
reflexum L.	30	—	Helianthemum, Cistinae,		
sanguineum L.	30	—	Sonnenröschen.		
(prostratum Cav.)			alpestre Dtn. siehe Ro-		
sang. lancastrienne With. 30	—		dax Steud.		
striatum L.	30	—	lavendulaefolium Pers.	—	—
phaeum L.	30	—	pilosum Pers.	50	—
Geum, Rosaceae, Nesselwurz.			roseum Moll. fol. var. 50	—	
* atosanguineum	30	—	rhodanthum Dun.	50	—
* chiloense Balb.	30	150	serpyllifolium Moll.	50	—
coccineum Sibth.	30	150	venustum Sweer.	50	—
„ flore pleno 50	—		vulgare Gaerntn.		
macrophyllum Willd. 20	—		„ flore luteo pleno 50	—	
Gladiolus, Irideae,			„ „ coccineopl. 50	—	
Schwertlilie.			Helianthus, Comp.-Heli-		
Brenchleyensis leuchtend			antheae, Sonnenblume.		
scharlach, das schönste			decapetalus L.	20	—
zu Gruppen	10	80	giganteus L.	20	—
floribundus	10	60	multiflorus L. fl. pleno 50	—	
gandavensis - Hybriden			strumosus L.	20	—
Rummel I.	10	100	trachelifolius Willd.	20	—
„ II.	8	60	„ foliis varieg. 30	—	
Zwerg. Zur Topfkultur			tuberosus L.	20	—
ausgezeichnet	10	100	Topinambur.		
Gillenia, Rosaceae.			Helenium, Comp.-Heli-		
trifoliata Mönch.	30	—	antheae.		
(Spiraea trifoliata L.)			autumnale L.	20	—
Globularia, Globulariaceae,			californicum	20	—
Kugelblume.			pumilum Willd.	20	—
Δ vulgaris L.	40	—	Heliopsis, Compositae-		
Gnaphalium, Comp. Gna-			Heliantheae.		
phalieae, Ruhrfrant.			laevis Pers.	20	—
magaritaceum L.	20	100			
Die reinweißen Blüten sind für					
Winterbouquets sehr werthvoll.					

	à St. à Dtz.			à St. à Dtz.	
	Pf.	Bf.		Pf.	Pf.
Helleborus, Ranuncula-			Δ* Hepatica, triloba	Chair. 20	100
ceae, Nießwurz.			(Anemone hepatica L.)		
* abschasicus A. Br.	50	300	Δ* triloba flore alba	20	150
Prächtig, dunkelpurpurroth.			Δ* " " coeruleo pl. —		
atrorubens W. et K.	30	200	Δ* " " rubro	20	100
angustifolius Hort.	20	150	Δ* " " " pleno 30	200	
cupreus Hort.	20	150			
foetidus L.	20	150	Heracleum, Umbelliferae.		
graveolens Hort.	2	150	villosum Fisch.	50	—
hyemalis siehe Erantl.			(giganteum Fisch.)		
intermedius Hort.	20	150	Wilhelmssii Fisch.	50	—
lividus Ait.	20	150	eminens	—	—
* niger L.	0	150	Decorative Blattpflanzen		
Christblume, blüht oft schon zu			Hesperis, Cruciferae,		
Weihnachten.			Nachtviole.		
niger grandiflorus	40	—	matronalis L.	10	50
T* olympicus Lindl.	40	—	" flore albo 20	80	
Reiß, großblumig.			" fl. albopleno 30	300	
pallidus	20	150	tristis L.	20	150
purpurascens	40	250	Wahre Nachtviole.		
species Abschasiae siehe			Heuchera, Saxifrageae.		
abschasicus			Δ americana L.	30	—
viridis L.	20	150	Δ caulescens Pursh	30	—
Helonias, Melanthaceae,			Δ divaricata Fisch.	30	—
Schwindblume.			Δ mycrantha Dougl.	30	—
T* bullata L.	50	—	Δ rubra	30	—
Keine zierliche, hellrothe Blumen			Δ Richardsonii R. Br.	30	—
eiförmiger Aehre, liebt feuchten			Δ villosa Mchx.	30	—
Standort			Hibiscus, Malvaceae,		
Hemerocallis, Hemero-			Sibirisch.		
callideae, Taglilie.			palustris L.	60	—
chinensis Hort.	30	—	Horminum.		
Middendorffiana Tranto			pyrenaicum L. siehe		
dunkelgelb	30	—	Melissa pyr.		
(Dumortieri Morr.)			Hoteia, Rosaceae Spiraea-		
flava L. goldgelb	30	—	ceae.		
fulva L. hochorange	30	—	japonica Lieb.	20	200
" foliis variegatis 40	—		100 Stück — 500		
" flore pleno	30	—	(Spiraea japonica).		
Quanso foliis variegatis —	—		Hyacinthus.		
Hepatica, Ranunculaceae,			belgicus Hort. siehe		
Leberblümchen.			Scilla cernua.		
Δ* angulosa Dec.	30	—	botryoides L. siehe		
(Anemone angulosa L.)			* Muscari racemosum.		
Großblumiges ungarisches Leberbl.					

	à St. à Dtz.	
	Pf. Pf.	
Hyacinthus.		
monstrosus L. siehe		
Muscari comosum.		
candicans, blühbare		
Zwiebeln . . .	£0 —	
schwächere . . .	25 —	
Plüthschaft 1 m. hoch mit		
großen weißen für Bouquetbinderei		
im Sommer sehr verwendbaren		
Plüthen.		
orientalis L. . .	20—60 —	
Zu einfachen und gefüllten Zer-		
ten Anfang September		
Hypericum, Hypericineæ,		
Johanniskraut.		
Androsæmum L. siehe		
Androsæmum offic.		
* calycinum L. . .	30 —	
Prächtig großblumig.		
Hyssopus, Labiatae, Hsop.		
officinalis L. . .	10 30	
Iberis, Cruciferae, Schleis-		
fenblume.		
corifolia Sweet. . .	— —	
Δ* Garrexiana All. . .	30 —	
sempervirens L. . .	20 —	
Dankbar blühende weiße Früh-		
jahrsblumen.		
Inula, Comp.-Veroniaceæ,		
Alant.		
Helenium L. . .	30 —	
verbascifolia Poir. Desf. 30	—	
Iris, Irideae, Schwertlilie.		
(Das Irisfortiment ist revisions-		
bedürftig.)		
acuta Willd. . .	20 100	
* amoena Red. = plicata.		
arenaria W. K. . .	30 150	
* aurea Link. = Gilden-		
staedtiana		
* biflora L. . .	30 150	
conglomerata . . .	30 150	
constantinopolitana		
Hort. Cremm. . .	20 100	
florentina L. . .	30 200	
Liefert die zilschenwurzel.		
formosa Hort. . .	30 200	
* foetidissima L. fol. var. 30	—	

	à St. à Dtz.	
	Pf. Pf.	
Iris, fragans Salisb. =		
subbiflora.		
germanica L. . .	20 100	
„ flore albo	20 100	
graminae L. . .	20 100	
Güldenstaedtiana Bbrst. 20	200	
„ varietas	20 200	
haematophylla Fisch	20 100	
halophylla Pall. . .	30 200	
hybrida halophylla ×		
coerulea . . .	30 —	
iberica Stev. (Oncocy-		
clus) . . .	50 —	
Auffallend schön, auch zur Topf-		
kultur geeignet.		
Kaempferi Sieb. . .	50 —	
„ varietas . . .	50 —	
Neue schöne japanische Art, ge-		
deiht am besten in Moorerde.		
laevigata Fisch. . .	—	
maritima Mill. . .	30 200	
Matthioli Tausch. . .	30 200	
Monnierii Red. . .	30 200	
moraeoides Ker (Moræa		
iridioides L.) . .	30 —	
notha Bbrst. . .	30 200	
Schöne species vom Kaukasus		
mit blauen bartlosen Blumen.		
notha varietas . .	30 200	
nudicaulis Lam. . .	30 200	
pallida Lam. . .	20 120	
(odoratissima Jacq.)		
Die Wurzel wird wie florentina		
benutzt, Wohlgeruch noch stärker.		
plicata Lam. . .	20 100	
pumila L. in 6 Farben	20 100	
„ nova . . .	—	
Wahrscheinlich aus pumila und		
olbiviensis entstanden, Blum n		
größer und mannigfaltiger als bei		
pumila		
Pseudacorus L. . .	20 100	
„ varietas	20 150	
Redouteana Spach . .	30 200	
* sambucina L. . .	20 100	
* sibirica L. . .	20 100	
* „ flore albo . .	20 100	
* „ variet. . .	20 100	

	à St. à Dtz.			à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.
* <i>Iris</i> , sordida Willd. =			<i>Lappa</i> , Comp.-Cynareae,		
squalens.			Ätete.		
* suaveolens	30	—	Kotschii	50	—
subbiflora Brst.	30	—	Decorative Blattpflanzen.		
(fragrans Salisb.)			<i>Leucium</i> , Amaryllidaceae.		
* spuria L.	30	180	Δ aestivum	30	—
* squalens L.	20	100	Δ vernum L.	10	100
* „ variet.	20	120	Großes Schneeglöckchen.		
* susiana L. (Oncocyclus) 75	—	—	<i>Levisticum</i> , Umbelliferae,		
Blume in Trauer. Die schönste			Gießstängel.		
aller <i>Iris</i> .			paludapifolium (Lmk.)		
* virescens Red.	30	200	Aschs.	30	—
Xiphium L.	20	100	(officinale Koch, Ligu-		
Spanische Schwertlilie.			sticum Levisticum L.)		
Xiphioides Ehrhr.	20	100	<i>Liatris</i> , Compositae,		
Englische Schwertlilie.			Prachtsparte.		
<i>Iris</i> in Hybriden			<i>T</i> spicata Willd.	30	80
in prachtvollen Varietäten 20	200		<i>Ligularia</i> , Compositae-		
<i>Jeffersonia</i> , Papaveraceae.			Senecionidae.		
diphylla Pers.	40	—	macrophylla Dec. (Ci-		
<i>Kitaibelia</i> , Malvaceae.			neraria macrophylla		
vitifolia Willd.	20	—	Ledeb.)	30	—
<i>Lactuca</i> , Compositae-Ci-			<i>Ligusticum</i> .		
choreae.			Levisticum L. siehe Le-		
perennis L.	30	—	visticum offic.		
virosa L ♂	20	—	<i>Lilium</i> , Liliaceae, Sibirien.		
<i>Lamium</i> , Labiatae, Taub-			auratum Lindl. 150 à 200	—	
nessel.			Goldbandlilie.		
Δ maculatum L.	20	—	bulbiferum L.	20	—
* Orvala L.	20	—	Feuerlilie.		
<i>Lathyrus</i> , Papilionaceae,			„ croceum 50	—	
Blatterbse.			Brownii	200	—
* grandiflorus Sibth.	30	150	canadense L.	—	—
cirrhosus Sering	30	—	candidum L.	10	100
heterophyllus L.	30	—	„ flore pleno 75	—	
* latifolius	30	—	„ fol. aur. var. 100	—	
* „ flore albo 30	—		carniolicum Bernh.	—	—
* „ flore roseo 50	—		chalcidonicum L.	50	—
* rotundifolius Willd.	30	250	scharlachrother Türken-		
* sanguineus Haberl.	30	—	bund		
(pisiformis L.)			chalcidonicum flore		
* sylvestris L.	30	—	coccineo	100	—
tuberosus L.	30	—	concolor Salisb.	—	—
			dalmatinum	—	—

	à St. à Dtz.			à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.
Lilium , davuricum Ker. 100 —			Linosyris , Compositae.		
giganteum Wallisch. — —			vulgaris Dec. . . . 20 150		
Humboldtii . . . — —			(Chrysocoma Linosyris L.)		
isabellinum siehe testa-			Linum , Lineae, Sein.		
ceum.			nervosum Waldst. Kit. 20 —		
lancifolium f. speciosum.			perenne L. . . . 20 —		
longiflorum Thb. . 50 —			Lippia , Verbenariae.		
Martagon L. Türfenbund 30 200			rodiflora Rich. . . 30 —		
„ flore albo 40 —			(repens Spr.)		
„ „ splendido 50 —			Lobelia , Lobeliaceae.		
„ „ pleno . 60 —			T* fulgens Willd. . . 40 —		
Michauxii . . . — —			T* „ Queen Victoria 50 —		
pensylvanicum Gwl. f.			Zur Bepflanzung von Gruppen		
davuricum.			ausgezeichnet.		
philadelphicum L. . — —			Lunaria , Cruciferae,		
speciosum Thunb. . — —			Mondblume.		
(lancifolium Hort.)			biennis Mönch . . 20 —		
„ album			rediviva L. . . . 30 —		
(Brussartii) 100 —			Lupinus , Papilionaceae,		
„ album co-			Lupine.		
rymbiflorum 100 —			* grandifolius Don. . 30 —		
„ punctatum 75 —			* perennis L. . . . 30 —		
„ roseum ver. 60 —			* polyphyllus Dougl. . 20 100		
„ rubrum . 50 —			In verschiedenen Varietäten		
„ Schrymakersii 50 —			Lychnis , Caryophyllaeae,		
Scovitzianum Fisch. 200 —			Lichtnelke.		
(colchicum).			Δ* alpina L. . . . 30 —		
Takesima 100 —			Rasenbildend mit leuchtend rothen		
testaceum (Isabelli-			Blumen		
num) 100 —			* chalcedonica L. . . 20 100		
tenuifolium Fisch. . — —			Brennende Liebe.		
Thunbergianum Schult. 50 —			* chalcedonica flore albo 20 120		
„ aureum			* do. fl. albo pl. — —		
nigro-maculatum . 50 —			* do. fl. carneo 20 100		
tigrinum Gawl. . . 30 —			* do. pl. major 30 180		
„ flore pleno 150 —			T* diurna Sibth. siehe		
umbellatum Pursh. 50 —			Melandrium.		
Standelaberkiste.			* hybrida Haageana . 40 —		
„ incom-			* fulgens Fisch. . . 40 —		
parabile 50 —			* Viscaria L. . . . 10 —		
Washingtonianum . — —			* „ flore pleno . 20 100		
Eißberglilie Californens.			* „ „ albo . 30 —		
Linaria , Scrophularineae,			* „ splendens . 30 180		
Frauenflachs.					
Cymbalaria Willd. . 20 100					
pilosa Dec. . . . 20 —					

	à St. à Dtz.			à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.
Lysimachia , Primulaceae,			Merendera , Colchicaceae.		
Gelbweiderich.			sobolifera Fisch. et		
ciliata L.	20	—	Meyer	50	—
punctata L.	20	—	Meum , Umbelliferae.		
verticillata L.	20	—	athamanticum Jacq.	50	—
Lythrum , Lythriaceae,			Mitella , Saxifrageae,		
Weiderich.			Bischofsstapel.		
acuminatum = virga-			diphylla L.	30	—
tum Willd.			Molinia , Gramina.		
myrtifolium Sweet. . .	30	—	* cœrulea Mönch. foliis		
ramosissimum	30	—	variegatis	10	100
* roseum superbum . .	30	180	Ein sehr zierendes, hartes bunt-		
Salicaria L.	20	120	blättriges Gras, das auch für		
tomentosum Mill. . .	30	—	Tepichbeete verwendbar, leicht		
* virgatum L.	20	120	Feuchtigkeit.		
Maclaya , Papaveraceae.			Monarda , Labiatae.		
cordata R.-Br.	50	—	dydyma L.	20	150
(Bocconia cordata Willd.)			Moraea .		
" japonica	50	—	iridioides L. siehe Iris		
Sehr dekorative Blattspitzen			moraeoides.		
mit blaugrauer Belaubung.			Morina , Dipsaceae.		
Mazus , Scrophulariaceae.			longifolia Wall. . . .	100	—
Pumilio R.-Br.	20	—	Muscari , Asphodeleae,		
Reizende Miniaturpflanze.			Traubenhyacinthe.		
Malva .			racemosum Willd. . .	10	100
moschata fl. albo . . .	30	—	(Hyacinth. belgicus Hrt.)		
Melandrium .			comosum Mill.	15	80
rubrum Gke.	40	—	(Hyacinth. monstrosus L.)		
(Lychnis diurna Sibth.)			Myosotis , Boraginaceae,		
Melissa , Labiatae, Melisse.			Bergißmeinnicht.		
Browniana	20	—	alpestris Schmidt . . .	10	50
Δ grandiflora L.	30	—	" flore albo	10	50
pyrenaica Jacq.	30	—	" nana cœrulea . . .	10	50
(Horminum p.)			" " fl. albo . . .	10	50
Melittis , Labiatae, Im-			" " " roseo . . .	10	50
menblatt.			Elise Fonrobert . . .	20	—
* Melissophyllum L. . .	30	—	Kaiserin Elisabeth . .	20	—
Mentha , Labiatae, Minze.			Zwei ausgezeichnete Neubelien.		
balsamea Willd. foliis			dissitiflora, blüht früher		
variegatis	20	100	als alpestris, prächtig	10	60
crispa L.	20	80	palustris L. semper		
sylvestris L.	10	50	florens	20	200
(viridis L.)					

	à St. à Dtz.			à St. à Dtz.	
	Pf.	Bf.		Pf.	Pf.
Narcissus , Amaryllidaceae, Narzisse.			Ophiopogon , Smilacaceae, Ratterzaufe.		
biflorus Curt.	10	60	T spicatus Kerr.	20	—
Bulbocodium L.	30	200	Orobis , Papilionaceae, Walberbse.		
incomparabilis Curt.	05	40	aureus Steven.	30	—
montanus Ker. siehe poculiformis.			* flaccidus Kit.	30	—
Orange Phoenix	10	80	* galeiformis	40	—
van Sion	10	60	* lathyroides L.	30	—
poculiformis Salisb.	10	60	niger L.	30	—
poeticus L.	05	20	sylvaticus L.	30	—
„ flore pleno	10	100	varius Solander.	40	—
radiiflorus Salisb.	10	60	* vernus L.	30	180
Nardosmia , Comp. Eupatoriaceae.			* „ flore albo	50	—
fragrans Rchbch.	20	150	* „ „ azureo	40	—
(Tussilago fragrans Will.)			Orontium .		
Nepeta , Labiatae, Katzenminze.			japonicum Thunb. siehe Rohdea japonica.		
azurea R.-Br.	20	120	Oxalis , Oxalideae.		
camphorata Bieberst.	20	120	* Lasiandra Zucc.	10	100
Nertera , Rubiaceae.			* tetraphylla Car.	10	100
T* scaparioides Lang.	30	—	* vespertilionis Zucc.	10	100
(N. depressa Hort.)			Gübische Einsammlungs-Pflanzen.		
Reizende Winterpflanze mit korallenrothen Beeren ganz bedeckt.			Ueberwinterung der Knollen trocken und frostfrei.		
Oenothera , Onagraceae, Nachtkerze.			Oxytropis , Astragaleae.		
* fruticosa L. major	30	200	argyrea Dec.	40	—
pumila L.	20	100	Pachysandra , Euphorbiaceae.		
serotina Sweet.	20	—	T* terminalis foliis var.	50	—
Omphalodes , Boraginaceae, Gartenvergissmelnicht.			Gübische Teppichpflanze.		
* Luciliae, sehr schön	—	—	Paeonia , Ranunculaceae, Pfingstrose.		
* verna Mönch.	10	50	Das Paeonienfortiment ist reichhaltig.		
* „ flore albo	—	—	arborea Don. siehe Moutan.		
Ononis , Papilionaceae, Sauhechel.			Baxteri Sabin.	100	—
* rotundifolia L.	40	—	corallina Retz.	100	—
Origanum , Labiatae, Dost.			„ purpurea	100	—
vulgare L.	20	100	commutata Wender	60	—
„ viride	20	100	decora Andr.	50	—
„ foliis variegatis	30	—	edulis Salisb. (albiflora).		
			„ chrysanthemi-flora	100	—

	à St. à Dtz.	
	Pf. Pf.	
Paeonia , edulis Comte de		
Paris	100 —	
edulis Duchesse		
d'Orleans	100 —	
„ formosa	100 —	
„ General Bertrand	100 —	
„ grandiflora	80 —	
„ lilacina plenissima	150 —	
„ Lowii	150 —	
„ Napoleon	100 —	
„ Non plus ultra	100 —	
„ odorata	100 —	
„ papaveracea	100 —	
„ Pottsii	60 —	
„ prolifera tricolor	100 —	
„ plenissima roseo		
superba	100 —	
„ Queen Victoria	100 —	
„ Reevesii	100 —	
„ Rose de Gand-		
brügge	100 —	
„ speciosa striata	100 —	
„ tricolor grandifl.	150 —	
„ Triomphedu Nord	100 —	
„ variegata	100 —	
„ Witleyi	50 —	
Eustemonia	100 —	
humilis Retz.	30 —	
„ flore pleno	30 —	
„ lobata	40 —	
intermedia C. A. Meyer	50 —	
* microcarpa Salm.	30 —	
Moutan Sims. (arborea		
Don.)	150—300 —	
* officinalis Retz. Willd.		
(simplex)	30 —	
„ simplex rosea	30 —	
* „ anemonaeflora	40 —	
* „ alba plena	30 —	
* „ carnea plena	50 —	
* „ foliosa Catal.		
Booth.	30 —	
* „ purpurea plena	— —	
* paradoxa Andr. san-		
guinea	50 —	
* paradoxa fimbriata	50 —	

	à St. à Dtz.	
	Pf. Pf.	
* Paeonia , paradoxa rosea	50 —	
* peregrina Mill.	30 —	
* „ bizanthina	50 —	
* „ compacta	50 —	
* „ Grewillii	50 —	
* „ Russii	80 —	
* „ pubescens	50 —	
* tenuifolia L.	30 200	
* „ flore roseo	50 —	
* „ „ pleno	100 —	
„ insignis	50 —	

Pancratium, Amaryllideae.

T* illyricum L. 50 —

Dieses sehr schöne Zwiebelgewächs verlangt eine Mischung von Laub-, Heide-, Mistbeeterde und scharfen Sand. Die Beete werden $\frac{1}{2}$ Fuß hoch mit Niefelnadeln gedeckt.

Papaver, Papaveraceae,

Mohn.

* bracteatum Lindl.	20 —
Δ caucasicum Bbrst. ♂	20 —
involucratum	20 —
Δ nudicaule L.	20 —
orientale L.	20 —
pilosum Sib. Sm.	20 —

Pardanthus, Irideae,

Farbnelbume.

* chinensis Ker.	50 —
--------------------------	------

(Moraea chinensis Thunb.)

Sehr schön, leuchtend scharlachroth blutroth getigert, hält unter geringer Decke aus.

Parthenium, Compositae,

integrifolium L.	30 —
--------------------------	------

Paronychia, Amaranthaceae.

serpillifolia Dec.	30 —
----------------------------	------

(Illecebrum serp. Vill.)

Zur Bekleidung von Felspartien, zierliche Kriecher.

Passiflora, Passifloreae,

Passionsblume.

T* incarnata L. schön!	— —
-----------------------------------------	-----

	à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.
Pennisetum , Gramina.		
<i>T* longistylum</i> Hochst.	20	150
Sehr dekoratives Gras für Bouquets gut verwendbar, frostfrei zu überwintern.		
Pentastemum , Scrophulaceae (Pentstemum).		
<i>Digitalis</i> Nuss . . .	30	—
<i>speciosum</i> Dougl. . .	40	—
Phalaris .		
<i>arundinacea</i> L. foliis variegatis f. <i>Digraphis</i> .		
Phlomis , Labiatae, Flammenlippe.		
* <i>Russeliana</i> Lagasc. . .	40	—
<i>Samia</i> L.	20	—
<i>tuberosa</i> L.	20	—
Phlox , Polemoniaceae, Blumenblume.		
Niederliegende Phlox.		
<i>pilosa</i> L.	10	150
<i>Rebsoni</i> , weiß . . .	10	100
<i>setacea</i> L.	10	150
„ <i>atropurpurea</i> . . .	—	—
<i>subulata</i> L.	10	100
<i>verna</i> L.	20	150
Hohe Phlox.		
a. <i>suffruticosa</i> Vent.		
Schmalblättriger Phlox.		
<i>Adonis maculata</i> .		
b. <i>acuminata</i> Pursh.		
(decussata l yoni)		
Breitblättriger Phlox.		
Ältere Sorten:		
<i>Triomphe de Twickel</i> violett, weiß gestreift.		
<i>Virgo Maria</i> reinweiß.		
<i>Maréchal Caillard</i> , leuchtend anilinroth, dunkles Auge.		
<i>Mad. Caillard</i> , salmrosa, dunkelpurpur Auge.		

	à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.
Beste Sorten von 1877:		
<i>E. Legouve</i> , bläulich schieferfarben, Auge dunkelviolett.		
<i>Jules Ferry</i> , dunkelmohnviolett, helles Auge.		
<i>M. Defond</i> , blendendroth, Auge lebhaft purpur.		
<i>Pictet de la Rive</i> , schön, schneeweiß, frühblühend.		
<i>York & Lancaster</i> , violett, weiß bespritzt, Petalen weiß gerundet.		
<i>Tyrolien</i> , weiß, violett amaranth gestreift.		
Beste Sorten von 1878:		
<i>Artaban</i> , kupfrig orange, Auge purpur.		
<i>Bradamante</i> , lebhaft salmfarbig, Auge violett.		
<i>Caucase</i> , porzellanweiß, Auge mohnfarben.		
<i>Durandal</i> , bläulich lila.		
<i>Jason</i> , dunkelrosa, Auge purpur.		
<i>La fille de Rolande</i> , mattweiß mit Karmin.		
<i>Madame Pauchet</i> , purpur mit violettrosa.		
<i>Purpre de Sidon</i> , lebhaft purpur.		
<i>Roman</i> , purpur, Auge karmoisin.		
Pfitzer'sche Züchtungen von 1880:		
<i>Mad. Boissier Naville</i> , zinnoberkarmin, Auge amaranth.		
<i>Franz Buchner</i> , karminviolett, Auge blutroth.		
<i>Frau Marie Kapf</i> , alabastrweiß, Auge amaranth.		
<i>Frau Marie Eisenlohr</i> , schneeweiß, Auge karmin.		

	à St. à Dtz.		à St. à Dtz.
	Pf. Pf		Pf. Pf.
Phlox, Pfitzerische Züchtungen		Potentilla, atropurpurea	
Prälat von Müller, hellvio-		Lodd.	30 —
olettroth, Auge karmin.		atrosanguinea Don. . .	30 —
Emil Hoesch, rosa, Auge		minima Hall K. . . .	20 —
amarant karmin.		(Brauneana Hopp.)	
Von diesem ausgewählten Sorti-		ochreate Lindl. in Wall.	20 —
ment erlasse soweit Vermehrung		pulcherrima Lehm. . .	30 —
vorhanden zum Frühjahr das Stück		reticulata	20 —
mit 50 Pf.		striata formosissima	30 —
Physalis, Solaneae, Zunderfirsche.		Potentilla Hybriden	
Alkekingi L.	20 —	(alle *)	
Phytolacca, Phytolac-		amabilis picta	
ceae, Kermesbeere.		Antwerpensis purpurea	
decandra L.	30 —	eximia resplendens	
esculenta	30 —	fulgida Russeliana	
Platycodon, Campanulaceae.		Fintelmanni speciosa	
grandiflorum Dec. fil. 50 —		Lucia spectabilis	
(Campanula grandifl. L.		marginata Smouthii	
Wahlenbergia grandiflora Schrad)		pro Stück	30 300
grandifl. flore coeruleo		Primula, Primulaceae . — —	
pleno 60 —		* acaulis Jacq. lilacina	30 —
„ „ albo pl. — —		* „ amarantina . . .	30 —
Polemonium, Polemonia-		* alba plena	60 —
ceae, Sperrkraut.		* lilacina plena	50 —
boreale Adams	20 —	* lutea plena	50 500
(humile Willd.)		* purpurea plena . . .	60 —
coeruleum L.	20 100	* Auricula L. Garten-	
„ flore albo 20 100		aurikel, Zuyfer,	
„ foliis varieg 20 100		Rangblumen	20 150
Polygala, Polygalaceae,		Auricula L. flore pleno	50 —
Kreuzblume.		auriculata Ledeb. . .	— —
Δ* Chamaebuxus L. . .	50	„ luteola, gelbblühend,	
Polygonum, Polygoneae,		Prinzel aus dem Kau-	
Rüsterich.		kasus	40 —
* Bistorta L.	20 100	Δ* cortusioides L. . . .	30 200
cuspidatum S. et Zucc. 10 80		* „ amoena	
(Sieboldii Hort.)		(grandiflora) 50 —	
pictum	20 —	„ flore albo 50 —	
sacchalinense	30 —	„ „ lilacino 50 —	
Potentilla, Rosaceae, Zin-		denticulata Sm. . . .	50 —
gerkraut.		Sehr dankbar blühend zur Früh-	
Δ alba L.	20 —	treiberei geeignet.	
		elatior Jacq. in prächtigen	
		Varietäten.	
		Schod 3 Mf.	10 100

	à St. à Dtz			à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.
Primula, varietas duplex.			Pyrethrum, corymbosum		
— Høse in Høse	25	250	Willd.	20	—
— integrifolia L. . . .	40	—	— macrophyllum Willd. . . .	20	—
— japonica A. Fray . . .	50	—	* — roseum Bbrst.	30	—
— „ alba	—	—	* — „ Delhayi	30	—
— „ splendida	—	—	* — „ Duch. de Brabant . . .	30	—
Die purpurrothe japanische			* — „ hybridum flore		
Prmel ist eine der besten			pleno in dichtgefüllten		
neueren Einführungen und			nachstehenden 6 Sorten:		
ganz winterhart.			à 50	—	
— latifolia Lapeyr. . . .	30	—	— Beauté de Laeken, Mo-		
— minima L.	30	—	dèle, Wilh. Pfitzer. Tri-		
— Murretiana Moritzi . .	—	—	omphe, P. Joume, Mad.		
— veris L., in vielen prach-			— Bouharlat.		
vollen Varietäten.			* — roseum Lewisii variegatum	30	—
— Schock 2 M.	10	50	* — „ Mülleri	30	—
Psoralea, Leguminosae,			— parthenifolium aureum		
— Harzflce.			(golden Feather).		
T* — strobiliana Hook. . .	40	—	Bekannt. Teppichpflanze	—	10
Ptarmica, Compos.-			— serotinum Willd.	30	—
— Achilleae.			— Tanacetum L.	20	—
— alpina Dec.	20	100	— tenuifolium Tenor f. Achillaea.		
— (Achillea alp. L.)			— Tschihadschewi	10	80
— nana Dec	20	—	Ist zur Hervorbringung eines		
— (Achillea lanata Lam.)			Nasenteppichs auf sterilem Terrain		
— macrophylla Dec. . . .	20	80	geeignet und findet auch als Tep-		
— (Achillea macroph. L.)			pichpflanze Verwendung.		
Pulmonaria, Boragineae,			Ramondia, Primulaceae.		
— Lungenfraut.			Δ* — pyrenaica Rich. . . .	50	—
* — mollissima	50	—	Ranunculus, Ranuncula-		
Δ — officinalis L.	20	—	— ceae, Hahnenfuß.		
— saccharata Mill. . . .	20	—	— aconitifolius L.	30	—
(mollis Wolff)			— „ flore pleno	40	—
* — virginica L.	40	—	— acer L. flore pleno	20	100
Eine der schönsten Stauden.			— chaerophyllus L.	30	—
Pulsatilla, Ranunculaceae.			— Ficaria L. flore pleno		
— alpina Spr., Teufelsbart	40	—	f. Ficaria ranunculoides.		
— montana Rchbch. . . .	40	—	— lanuginosus L. flore pleno	20	100
— vulgaris Mill.	40	—	— pyrenaeus L.	50	—
Pyrethrum, Compos. An-			Δ — plantagineus All. . . .	50	—
— themideae, Bertram-			— repens L. flore pleno . . .	10	60
— wurz.			— speciosus flore pleno . . .	50	—
— atrosanguineum	30	—	— asiaticus L.	05	50
— carneum Bbrst. . . .	30	—	Gefüllte Gartenranunkeln		
			(Schottische, Türkische)		
			— „ superbissimus	08	60

	à St. à Dtz.		à St. à Dtz.
	Pf. Pf.		Pf. Pf.
Rhaponticum , Compos.		Salix , Amentaceae, Weide.	
Cynareae.		Δ herbacea L. . . . 40 —	
cynaroidis Less. . . . 50 —		Δ retusa L. . . . 40 —	
(Carduns inermis Pers.)		Δ var. serpyllifolia Scop. 30 —	
scariosum Lam. . . . 50 —		Salvia , Labiatae, Salbei.	
(Centaurea rhapontica L.)		Sibthorpii Smith. . . 20 —	
Rheum , Polygoneae, Rha-		(campestris Bbrst.)	
barber.		virgata Ait. . . . 30 —	
australe Don. . . . 50 —		(rubra Sprg.)	
(Emodi Wall.)		Sanguinaria , Papavera-	
Die Blätter treiben sehr spät		ceae, Blutfraut.	
und kupferroth aus und haben eine		canadensis L. . . . 30 —	
prächtige Herbstfärbung.		Sanguisorba , Rosaceae,	
cripum Andr. . . . 50 —		Wiesenknopf.	
macroleprium . . . 50 —		auriculata All. Scop. =	
macrorrhizon . . . 50 —		officinalis.	
officinale Baillon . . . — —		dodecandra Morett. 30 —	
Chinesischer Rhabarber mit		officinalis L. . . . 20 —	
großen sehr distincten Blättern,		tenuifolia Fisch. Link. 30 —	
junge Samenpflanzen . . . 60 —		Saxifraga , Saxifrageae,	
palmatum L. typicum		Steinbrech.	
Junge Samenpflanzen 60 —		(Alle Δ.)	
" tanguticum		Aizoon L. . . . 30 —	
Kgl. Ver.		acanthaefolia . . . 20 —	
Junge Samenpflanzen 60 —		angustifolia Hort. =	
Tibetanischer Rhabarber mit di-		hypnoides.	
stinkten bandförmigen Blättern.		caespitosa L. . . . 20 —	
Die neu eingeführten Rheum		ceratophylla Ait. . . 20 —	
off. un palm. tanguticum sind		cordifolia Haw. . . . 30 —	
außer ihrem medizinischem Werth		crassifolia L. . . . 50 —	
auch Blattpflanzen ersten Ranges.		decipiens Ehrh. . . . 20 —	
undulatum L. . . . 50 —		elator Mert. Koch =	
var. Queen Victoria 50 —		Hostii.	
Der beste für die Küche.		exarata Vill. . . . 20 —	
Rhodea , siehe Rohdea.		geranioides Hort. =	
Rhodiola rosea L. siehe		petraea.	
Sedum Rhodiola L.		Geum L. . . . 20 —	
Rohdea , Acorninae.		Hostii Tausch. . . . 20 —	
japonica Roth . . . 20 —		hypnoides L. . . . 10 30	
(Orontium japonicum		longifolia Lapeyr. . . 30 —	
Thunb.)		media Gouan. . . . 30 —	
Rudbeckia , Comp.-Heli-		muscoides Wulf. . . . 20 —	
antheae.		nivalis L. . . . 20 —	
* fulgida Ait. . . . 30 180		oppositifolia L. . . . 30 —	
Rubus , Rosaceae.			
Δ arcticus L. . . . 40 —			

	à St.	à Dtz.
	Pf.	Pf.
Saxifraga , Parnassii . . .	20	—
pedatifida Ehrh. . .	20	—
petraea L. (Pona Sternb.) . .	20	—
punctata . . .	20	—
rotundifolia L. . .	20	—
T sarmentosa L. . .	20	—
Schraderi Sternb. =		
hypnoides . . .	20	—
serrata Link. . .	20	—
spalulata Desf. . .	20	—
submutica Hort. S. =		
Aizoon.		
umbrosa L. Schf 1,25 M. 10	30	30
Scabiosa , Dipsacae,		
Stabiose.		
caucasica Bbrst. . .	30	—
" connata . . .	30	—
elata Hornem. . .	30	—
Grammuntia L. = Ce-		
phalaria tatarica R. S.	20	100
Δ* graminifolia L. . .	40	—
* succisa L. . .	30	—
Scilla .		
* amœna L. . .	10	50
* bifolia L. . .	10	50
* cernua Hffm. (Hyacinth.		
belgicus) . . .	20	—
* sibirica Andrews . . .	10	60
Scutellaria , Labiatae,		
Gefmfrant.		
* alpina L. . .	30	—
(variegata Spr. fl.)		
peregrina L. . .	20	—
viscida Sprgl. fl.	30	—
Sedum , Crassulaceae,		
Mauerpfeffer.		
(Mlle Δ.)		
acre L. . .	10	—
Aizoon L. . .	20	—
album L. . .	20	—
altissimum Poir. . .	20	—
Anacampseros L. . .	20	—
T dasyphyllum L. . .	30	—
elegans Lejeun. = reflexum.		

	à St.	à Dtz.
	Pf.	Pf.
Sedum , elongatum Wall. 30	—	
Ewersii Ledeb. . .	30	—
Fabaria Koch . . .	30	—
Forsterianum Smith. . .	30	—
hybridum L. . .	20	—
ibericum St. . .	20	—
involutum Bbrst. . .	20	—
Kamtschaticum F. et K. . .	30	—
maximum Hoffm. . .	30	—
neglectum Tenor . . .	20	—
ochroleucum Smith. =		
altissimum.		
oppositifolium Sims. . .	20	—
pallidum Bbrst. = rubens.		
populifolium L. . .	20	—
pulchellum Michx. . .	30	—
(pulchrum Dec.)		
purpureum Link.		
(Fabaria Hort.) . .	30	—
rubens L. . .	20	—
Telephium L. . .	20	—
Sempervivum , Crassula-		
ceae, Hauswurz.		
(Mlle Δ.)		
acuminatum Schott.		
alpinum Griseb.		
arachnoideum L. . .	20	—
arenarium Koch.		
assimile.		
avernense.		
bulbulatum Schott.		
Boutingianum.		
Braunii Funk.		
Comonollii.		
calcareum Jord.		
(californicum Hort.)		
cornutum.		
dolomitum.		
fimbriatum Klotzsch.		
(globiferum L.)		
Funkii Braun.		
glaucum Tenor.		
globuliferum.		
Hausmanni.		
hirtum L.		
heterotrichum.		

	à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.
Sempervivum, Heuffelii.		
— Laggeri	20	100
— majus Neck = montanum.		
— Mettenianum Lehm et Schnittsp.		
— Metteanum.		
— montanum L.		
— „ Blasii.		
— Neilreichii.		
— Noltei.		
— „ patens.		
— penicillatum.		
— Pittonii.		
— piliferum.		
— Reguenii.		
— ruthenicum.		
— spinosum Thumb.	20	—
(Umbilicus.)		
— soboliferum Sims.		
— tectorum L.		
— „ vom Jura.		
— tomentosum	20	100
— triste	20	100
— Transsylvanicum.		
— violaceum.		
— „ Blasii.		
— Verlotii.		
— Wulfenii Hoppe.		
— sp. von Helvetia.		
Von vorstehenden Sempervivum erlassen wir das Stück mit	10	50
Senecio, Comp. Jacobae,		
— Kreuztraut.		
— alpinus Scop.	20	—
— Doria L.	20	—
— tetrandus Dec.	20	—
(cordatus Wall.)		
Sibbaldia, Rosaceae.		
— ΔT cuneata	30	—
Silene, Caryophylleae,		
— Leimtraut.		
— alpestris Jacq.	20	120

	à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.
Silene, fimbriata Sims.		
— Δ^* inflata Smith. fl. pl.	—	—
(maritima With. Sm.)	—	—
— T^* orientalis Mill. δ	30	—
— pendula	10	50
— „ ruberrima	10	50
— Δ Saxifraga L.?	30	—
— Zawadzkii Herbich	20	—
Silybum, Compositae.		
— Cardui, Mariendistel.		
— eburneum	20	—
Silphium, Compositae.		
— liantheae.		
— erythrocaulon Bernh.	30	—
— laciniatum L.	50	—
Die nordamerikanische Kompasspflanze. Die schönen geweihartig geförmigten Blätter nehmen theils eine horizontale theils eine vertikale Stellung an, woraus die Jäger der Prärien die Himmelsrichtung erkennen wollen.		
— perfoliatum L.	30	—
Sisymbrium, Cruciferae.		
— austriacum Jacq.	20	—
(multisiliquosum Hoff.)		
Sisyrinchium, Irideae,		
— Schweinsrüssel.		
— * anceps Lam.	30	200
— T Bermudianum L.	50	—
— T^* californicum Spr.	50	—
— reticulatum	50	—
— sehr starkwüchsig.		
— striatum Smith.	50	—
— sehr starkwüchsig.		
— sulphureum	50	—
Zierliche Einfassungspflanzen, auch zur Topfkultur geeignet, californicum hat auffallend große gelbe Blumen und blüht bis in den Herbst.		
Smilacina, Smilacaceae.		
— stellata Desf.	40	—
Soldanella, Primulaceae,		
— Alpenglockchen.		
— Δ^* alpina L.	50	—
— Δ^* montana Willd.	50	—
Reizende Frühjahrsblumen.		

aSt. à Dtz.
Pf. Pf.

Solidago, Comp.-Asteræ,
Goldruth.

acuta	20	—
altissima L.	20	—
* bicolor L.	30	—
canadensis L.	30	—
elliptica Ait.	30	—
grandiflora Desf.	30	—
(lanceolata Ait.-Michx.)		
lateriflora Rafin.	30	—
livida Willd.	30	—
paniculata Dec.	20	—
procera Ait.	20	—
recurvata Willd.	30	—
* Shortii Torr. et Gr.	20	—
serotina Ait.	20	—
Virgaurea L.	20	—

Sonchus, alpinus siehe
Mulgedium alpinum.

Spiraea, Rosaceæ, Spier-
staude.

* acuminata	20	—
* Aruncus L.	30	—
" glomerata	40	—
* " rubella	40	—
camschatica Pali.	20	—
caucasica	20	—
filipendula L.	20	—
* " flore pleno	30	300
* " nana fl. pl.	30	—
Humboldtii	30	—
* japonica Sieb.	20	150
(Holteia japonica.) % 10 M		
* palmata Thumb.	60	—
die schönste unter den roth-		
blühenden.		
trifoliata siehe Gillenia.		
Ulmara L.	20	—
* " flore pleno	30	—
* " foliis variegatis	30	—
* venusta O. et D.	40	240
Sehr schön, rosa.		

Stachys, Labiatae, Zieft.

grandiflora E. Meyer	20	—
lanata Jacq.	20	—

aSt. à Dtz.
Pf. Pf.

Stachys, longifolia Benth. 20 —

* speciosa Hook. siehe
Gardoquia elliptica.

Statice, Plumbagineæ,

Strandnelke.

(Alle *).

bellidifolia Dec.	30	—
eximia	50	—
Erinus L.	40	—
latifolius Smith.	40	300
Limonium L.	40	—
reticulata L.	40	—
scoparia Pall.	40	—
spathulata Desf.	40	—

Stenactis.

* speciosa Lindl. siehe
Erigeron spec.

Stevia, Compositæ-Eupa-
torineæ.

Eupatoria Willd.	30	—
Lindleyana	30	—
purpurea Willd.	50	—

Die Stevien müssen frostfrei
überwintert werden; sind für Bou-
quetbinderei sehr werthvoll.

Stipa, (Stupa) Gramina.

capillata L.	20	—
* pennata L. Federgras	30	—
splendens Trin.	30	—

Symphandra, Campa-

nulacæ, Bandglocke.

* pendula Dec.	50	—
------------------------	----	---

Tagetes, Compos.-Tage-
teae, Studentenblume.

7* lucida Cav.	20	200
------------------------	----	-----

Mit wohlriechenden nach Anis
duftenden zierlichen Blüthen, für
Bouquetbinderei noch im Oktober
und November sehr verwertbar,
muß frostfrei durchwintert werden.

Tanacetum, Comp.-Anthe-
mideæ, Wurmfrant.

vulgare L. var. cris- pum	20	—
----------------------------------------	----	---

	à St. à Dtz.			à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.
Telekia , Compos. Asteroideae.			Tricirtis , Liliaceae.		
cordifolia Dec.	30	200	hirta	—	—
(speciosa Bamg. Hook.)			„ fol. variegatis	—	—
Tellima , Saxifrageae			Trifolium , Papilionaceae.		
Δ grandiflora Lindl.	30	—	Mec.		
Teucrium , Labiatae, Gamanther.			rubens L.	30	—
aureum Schrb.	10	100	„ flore albo	30	—
Zierliche silbergraue Teppichpflanze.			repens L. fol. atropurpureis	30	—
Chamaedrys L.	30	—	Trillium , Smolaveae.		
flavum	20	—	Dreiblatt.		
Polium L.	30	—	Δ* atropurpureum.		
Thalictrum , Ranunculaceae, Wiesentrut.			Δ* grandiflorum Salisb.		
alpinum L.	20	—	Keine Stauden für feuchte schattige Läge.		
anemonoides Moix.	20	—	Tritonia , siehe Crocosmia.		
angustifolium L.	20	—	Trollius , Ranunculaceae.		
aquilegifolium L.	20	—	Trollblume.		
concinnum Willd.	20	—	aconitifolius Hort. = eucopaueus.		
Kochi	20	—	* americanus Mhlbg.	40	—
lucidum Jacq.	20	—	* atrobatensis	30	—
minus	20	—	* aureus Tausch.	30	—
„ var. flexuosum	20	—	* europaeus L.	20	120
purpurascens L.	30	—	„ flore albo	50	—
sibiricum L.	20	—	* giganteus	30	—
speciosum Mill. = lucidum.			* orientalis	30	—
spuarrosum Stephan	20	—	* orientalis	30	—
tuberosum L.	30	—	* Smouthii	30	—
Thymus , Labiatae, Thymian.			tauricus Hort. = europaeus.		
hirsutus Bbrst.	30	—	Tulipa , Liliaceae-Tulipa-		
vulgaris L. fol. var.	30	—	ceae, Tulpe.		
Tiarella , Saxifrageae, Spitzhütchen.			Gesneriana L.	100 Stück 4,50	10 60
Δ cordifolia L.	10	50	G. monstrosa	10	80
Tigridia , siehe Ferrara.			Papagei-Tulpen		
Tradescantia , Commelineae.			Gefüllte frühe und späte Tulpen	10	100
* virginica L.	20	120	Greigii	100	—
* „ rubra plena	30	—	silvestris L.	10	60
			(florentina odorata).		
			Tussilago , Comp.-Jacobaeae, Huflattig.		
			Δ fragrans Vill. siehe Narcosmia fragrans.		

	à St. à Dtz.			à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.		Pf.	Bf.
Umbilicus, Crassulaceae.			Δ Veronica, prostrata L.	20	—
TΔ erectus Dec.	30	—	Δ saxitilis L.	30	—
TΔ spinosus Dec.	30	—	Schmidtii Röm. Schult.		
Uniola, Gramina.			= Teucrium.		
<i>latifolia</i> Mchx.	50	—	<i>spuria</i> L.	20	—
<i>Sehr dekoratives Stiergras</i>	—	30	<i>suffruticosa</i>	30	—
Uvularia, Melanthaceae,			<i>Teucrium</i> L.	20	—
<i>Bäpfehtraut.</i>			<i>varietas incisa.</i>	—	—
<i>perfoliata</i> L.	40	—	<i>virginica</i> L.	—	—
Valeriana, Valerianaceae,			<i>var. incarnata</i>	30	—
<i>Balbian.</i>			Vinea, Apocynaceae, Simt-		
<i>sambucifolia</i> Mikan.	30	—	<i>grün.</i>		
<i>supina</i> L.	30	—	Δ herbacea W. K. Ampel-		
<i>tripteris</i> L.	50	—	<i>pflanze</i>	10	30
Veratrum, Melanthaceae,			Δ major L.	20	100
<i>Germer, Nieswurz.</i>			<i>foliis variegatis</i>	20	200
Δ album L.	50	—	<i>minor</i> L.	10	30
<i>(Lobelianum Bernh.)</i>			<i>foliis argenteo</i>		
Δ nigrum L.	50	—	<i>variegatis</i>	20	100
<i>Dekorative Stauden als Soli-</i>			<i>flore albo</i>	20	80
<i>tairpflanzen auf Rasen.</i>			<i>„ pallido</i>	10	40
Verbascum, Scrophulari-			<i>„ rubro pleno</i>	20	80
<i>neae, Königsferze.</i>			Vincetoxicum, Asclepia-		
<i>phoeniceum</i> L.	20	100	<i>daceae.</i>		
<i>Sehr schön in weiß, rosa, violett.</i>			<i>medium</i>	—	—
Veronica, Scrophularineae,			Viola, Violaceae, Veilchen.		
<i>Chrenpreis.</i>			Δ* cucullata Ait. Ell.		
<i>alpina</i> L.	20	—	<i>var. striata</i>	20	—
<i>austriaca</i> L.	20	—	<i>(obliqua Ait.)</i>		
<i>Bachofenii</i> Heuff.	30	—	<i>odorata</i> L.		
Δ bellidioides L.	30	—	<i>arboresc. fl. pl.</i>	—	—
<i>crenulata</i> Hoffm.	30	—	<i>„ Belle de Cha-</i>		
<i>corymbosa</i> Hort. Lond.	30	—	<i>tenay (Paillet)</i>	50	—
* <i>elegans</i> Dec.	30	—	<i>Neues gefülltes Treibveilchen</i>		
Δ fruticulosa L.	30	—	<i>mit sehr großen weißen Blumen,</i>		
Δ gentianoides Sims.	20	100	<i>die schwach violett gerändert sind.</i>		
<i>glabra</i> Ehrh. Schrad.			<i>„ flore coeruleo</i>		
= <i>spuria.</i>			<i>pleno</i>	10	80
<i>latifolia</i> L.	20	—	<i>„ Kronprinzess</i>		
<i>maritima</i> L.	20	—	<i>von Deutsch-</i>		
<i>pallida</i> Hornem. =			<i>land (Göschke)</i>	50	—
<i>gentianoides.</i>			<i>Neueit vom Bismarckveilchen</i>		
* <i>pinnata</i> L. <i>Sehr schön.</i>	40	—	<i>gezogen, mit noch größeren pur-</i>		
Δ Ponaë Gouan.	30	—	<i>purviolettten Blumen.</i>		

	à St. à Dtz.	Pf.	Pf.
Viola, Lauchena . . .	10	80	
— Ein Bastard von rossica und semperflorens, vereinigt die guten Eigenschaften beider, un- gemein reichblumig % 8 Mark.			
„ Lee's Victoria			
„ Regina . . .	15	100	
— Bismarckveitchen, gehört zu den größten bis jetzt bekannten Veitchen.			
„ Marie Luise flore pleno — —			
„ rossica . . .	15	120	
„ Russisches Treibveitchen.			
„ the Czaar . . .	10	80	
Vittadenia, Compositæ.			
triloba Dec.	—	—	
Neu, mit bestisählichen röth- lichen Blumen, von Frühjahr bis Herbst blühend.			
Wahlenbergia.			
* grandiflora Schrad. f.			
Platycodon.			
Waldsteinia, Rosaceae.			
Δ geoides Willd. . . .	20	100	
Δ trifoliata Koch. . . .	10	50	
Wulfenia, Scrophularineæ.			
carinthiaca Jacq. . . .	40	—	
Xanthogalum.			
purpurascens	—	—	
Xerophyllum, Junceae,			
Hartblatt.			
— setifolium Mchx. . . .	—	—	
* (asphodeloides Spr.)			
Ausgezeichnet, g. nicht im An- sehen einem Dasylirion.			
Yucca, Coronariae-Spatha			
ceae.			
filamentosa L.			
Erträgt unsere norddeutsch-n Winter uneingebunden mit leich-			

	à St. à Dtz.	Pf.	Pf.
ter Laubdecke auf den Wurzeln sehr gut, während sie eingebun- den oft leidet. Als Solitairpfl. eine große Zierde der Rasenstücke. Blühbare Exemplare 0,75 à 1,5 Mk. Kleinere			50 Pfg.
Zosimia, Umbelliferae.			
T absinthifolia Dec.	—	—	
(Heracleum absinthifo- lium Vent.)			
Einführung aus Persien, präch- tige Solitairpflanze.			
latifolia Ren, desgl. — —			
In pikirten Samenpflanzen sind abzugeben à Stück 20 Pfennig:			
Asclepias tuberosa.			
Alyssum saxatile compactum.			
Amphicarpaea monoica.			
Andryale candidissima.			
Aster floribundus.			
Anisodes luridus.			
Anemone multifida.			
„ Pulsatilla.			
Antirrhinum rupestre.			
Arabis alpina.			
Achillaea moschata.			
Ca'ananche candidissima.			
Datisca cannabina.			
Desmodium canadense.			
Geum coccineum atrosanguinum flore pleno.			
Lychnis grandiflora gigantea.			
Potentilla cataclines.			
Pentstemon Lobbii.			
„ cordifolius.			
Peltaria angustifolia.			
Sedum Maximowiczii.			
Scrophularia chrysantha.			
Verbascum olympicum.			

Freilandfarne.

Die hier aufgeführten Freilandfarne bieten eine Auswahl des Besten und eignen sich ganz ausgezeichnet zur Bepflanzung von Felspartien, schattigen Abhängen oder sonst schattigen Stellen unter Bäumen, wo Gras nicht mehr fortkömmt. Mit Hilfe derselben kann man an sonst fahlen und hässlichen Stellen eines Gartens oder einer Parkanlage einen üppigen Pflanzenwuchs hervorbringen und dadurch den sonst vermiedenen Stellen einen ungewöhnlichen Reiz verleihen. Wir haben die Preise sehr billig gestellt um dadurch die allgemeinste Verbreitung dieser seither vernachlässigten Gewächse zu ermöglichen.

	à St. à Dtz.		à St. à Dtz.
	Pf. Pf.		Pf. Pf.
Adiantum L. Haarfarn.		Blechnum L. Rippenfarn.	
— pedatum L.	50 —	Spicant Wilh.	25 200
Aspidium Sw. Schiffsfarn.		Zur Bekleidung feuchter, schattiger Stellen vorzüglich.	
erythrosorum	60 —	(Lomaria Spicant Desv.)	
Filix mas (L.) Sw.	30 —	Cyrtomium , Bogenfarn.	
— „ daedaleum	75 —	T atratum Hort.	100 —
— „ furcatum schön	100 —	T falcatum Prest.	50 —
— „ monstrosum „	75 —	T Fortunei Prest.	100 —
— „ Pinderi sehr schön	100 —	Cystopteris Bernh.	
Goldieanum Hook.	100 —	fragilis Bernh.	50 —
lobatum Sw.	75 —	bulbifera Bernh.	50 —
spinulosum Sw.	50 —	Gymnogramma Desv. , Schriftfarn.	
Thelypteris Sw.	50 —	triangularis	— —
Asplenium L. Strichfarn.		Neue Einführung vom Dreieck, das erste Goldfarn fürs Katthaus, soll in England im Freien aushalten.	
Adiantum nigrum L.	50 —	Lastraea , siehe Aspidium.	
Ruta muraria L. Mauer- raute, in Mauerrißen zu pflanzen, um altem Gemäuer mehr Reiz zu verleihen	25 200	Lomaria Willd. Saumfarn.	
septentrionale Hoffm.	— —	alpina Spr.	50 —
wie Ruta muraria zu ver- wenden.		Reizendes kleines Farn.	
Trichomanes L. desgl.	30 —	Spicant siehe Blechnum.	
Athyrium , Rth.		Onoclea L.	
Filix femina Bernh.	50 —	sensibilis L.	50 —
— „ corymbiferum	50 —	Struthiopteris Hoffm.	30—50 —
— „ cristatum	100 —	(Struthiopteris germa- nica Willd.)	
— „ Elworthy schön	75 —	Wegen des trichterförmigen Baues unstreitig eins der schönsten Farne.	
— „ multifidum „	60 —		
— „ multiceps	60 —		
— „ Tritzelliae	75 —		

	à St.	à Dtz.		à St.	à Dtz.
	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.
Osmunda Tourn.			Pteris L., Adlerfarn.		
regalis L.	100	—	aquilina L.	25	—
Das imposanteste einheimische			Topfexemplare	50	—
Farn, von ausgezeichneter Wirkung			Scolopendrium Sm.		
in schattigen Partien des Parks			vulgare Symons	30	—
frei auf Rasen truppweise gruppiert.			(Scol. officinarum Sw.)		
regalis var. cristata . 200	—	—	Hirschwurze.		
Interessante Neuheit.			Bekanntes sehr ornamentales		
Phegopteris Fee.			Farn, Varietäten die Stammform		
Dryopteris Fee	50	—	an Schönheit weit übertreffend.		
(Polypod. Dryopt. L.)			vulgare acutale	50	—
hexagonopterum Fée	50	—	crispum schön!	75	—
Robertianum A. Br.	50	—	cristatum	75	—
(calcareum Fée).			daedalium schön!	100	—
Physematum f. Woodsia			digitatum extra!	100	—
Polypodium L., Tüpfel-			undulatum schön		
farn.			und selten!	100	—
vulgare L., Engelsfarn	25	200	nudicaule	50	—
Zur Bekleidung von schattigen			Struthiopteris f. Onoclea.		
selbst trockenen Abhängen ausge-			Woodsia.		
zeichnet.			obtusa Hook.	—	50
vulgare L. var. auritum			Selaginella Spring.		
Willd.	50	—	Moosfarn.		
" " eristatum	50	—	helvetica Spring.	—	50
" " cambricum L.	50	—	Reizende, vollständig winter-		
Unbedingt die schönste Varietät			harte Selaginelle von den schatte-		
aber etwas empfindlich.			gen Bergabhängen der Schweiz die		
Polystichum, D. C.			in den Gärten so gut wie gar nicht		
angulare Pr. var. gran-			bekannt ist, während sie die allge-		
didens schön	75	—	meinste Verbreitung verdient. In		
decursive-pinnatum Kge.	100	—	jedem noch so kleinen Garten fin-		
			det sich ein Plätzchen für dieses		
			zierliche Pflänzchen.		

12 Sorten Freiland-Farne nach unserer Wahl 4 Mark.

12 Sorten Freiland-Farne nach unserer Wahl, feinere, 6 Mark.

Freiland-Erken.

Die Kultur der Freiland-Erken macht nur geringe Mühe, da es genügt dieselben auf ein mit Heideerde gemischtes Gartenbeet in sonniger Lage zu pflanzen und den Boden im Winter etwas zu decken. Wir kul-

tiviren ein sehr empfehlenswerthes Sortiment, von welchen die mit einem * versehenen Arten für seine Bouquetbinderei unentbehrlich sind.

- * *Erica Tetralix* L. alba großglockig, die früheste, August.
- * " " *Mackayana* Bab.
- * " *vagans* L. (multiflora Huds.) sehr reichblumig, Septbr.
- * " " alba.
- * " *carnea* L. (herbacea L.)
- " *ciliata* L. sehr zierlich, mit großen dunkelrothen Blüthen im Spätsommer, verlangt leichte Decke.
- * *Calluna vulgaris* L. alba spätblühend.
- * " " *Alporti*, dunkelroth, sehr schön.
- " " *dumosa* } für Felspartien wegen des nieder-
- " " " *aurea* } liegenden Wuchses sehr geeignet.
- * " " *elata*, weiß, spätblühend.
- * " " *flore pleno*, reizend.
- " " *fol. arg. var.*, zur Bekleidung von Felspartien.
- * " " *Hamiltoniana*, groß, weißblühend.
- * " " *pumila*, weiß, frühblühend, in Knospen sehr effektiv.
- " " *prostrata*, für Felspartien wegen des niederliegenden Wuchses sehr geeignet.
- " " *pygmaea*, reizende Zwergform.
- * " " *Reginae*, weiß, mittelfrüh.
- " " *Searly*, weiß, späteste.
- " " *tomentosa*, sehr distinkt.

Bryanthus erectus, roth, großblumige sehr schöne Ericacee, blüht im Frühjahr.

Vaccinium macrocarpum Ait. (Cranberry).

10 Stück 50 Pfg. (je 2 Pfl. in einem Topf, stark durchwurzelt).

Die großfrüchtige Preiselbeere bildet in Amerika einen bedeutenden Handelsartikel und liefert dort pro Acker (c. $\frac{1}{2}$ Hektar) einen Betrag bis 500 Dollar, wird auch bei uns schon vielfach versuchsweise angepflanzt. Durchaus winterhart und gedeiht sowohl in Moor- als auch in feuchtem Sandboden.

1. Ananas- Erdbeeren.

Fragaria grandiflora.

100 Stück 1 Mark.

Anna Elisabeth (hortus Wernigerod.) Frucht groß, hellroth, hahnenkammartig, aromatisch, sehr volltragend.

Belle de Paris großfrüchtig, spät, 1. Rang.

Brown's Wunder (Child & Lorimer 1871). Frucht mittelgroß, beinahe rund, hellroth, Fleisch weinartig, süß, fein aromatisch, erstaunliche Fruchtbarkeit.

Cremont.

Delice d'Automne spät, vorzüglich.

Dr. Nicaise. Frucht sehr groß, oft enorm groß, monströse Form, hellorangeroth mit purpur, Fleisch weißlich rosa, weich, mäßig tragbar, Schaufrucht.
Elton Pine (Knight). Frucht groß, dunkelroth, kegelförmig oder vierkantig, Fleischroth, schmelzend, sehr säuerlich, gewürzreich, reichtragend, für nördliche Lagen, zu Confitüren.

Globe (de Jonghe) großfrüchtig, ziemlich spät, 1. Rang.

Goliath oder Riesenerdbeere (Kitlag) Frucht sehr groß, zinnoberroth, abgestumpft kegelförmig. Fleisch weiß, saftig, gewürzreich, reichtragend, spät, für feuchten Boden.

Gabriele (Dr. Nicaise). Frucht ziemlich groß, dunkelroth, Fleisch roth, sehr fest, süß, sehr saftig, sehr reichtragend, sehr spät reifend.

Keen's Seedling. Frucht groß, früh, 1. Rang.

Lucas (de Jonghe). Frucht sehr groß, dunkelfarmoisin, rundlich, Fleisch rosa, schmelzend, sehr süß, ziemlich spät, reichtragend, werthvoll zum Treiben.

Marguerite (Lebréton). Frucht sehr groß, glänzend roth, länglich kegelförmig, gelappt und zugespitzt, Fleisch orangeroth, süß, gewürzreich, sehr tragbar, 1. Rang.

Merveille.

Perfection (Dr. Nicaise). Frucht groß, dunkel weinroth, kegelförmig oder gelappt, Fleisch dunkelroth, sehr saftreich und gewürzig, Buchs kräftig, äußerst volltragend, früh.

Reuz van Zuidwijk (C. van de Water). Frucht sehr groß, abgeplattet oder kammförmig, lebhaft zinnoberroth, Fleisch röthlich, schmelzend, sehr angenehm aromatisch, sehr spät.

Roseberry maxima (Nouvel). Frucht groß, verändertlich rundlich oder breitgedrückt, Fleisch reiblich, saftig, aromatisch, vorzügliche Treibsorte.

Sir Joseph Paxton (Bradly). Frucht sehr groß, rund oder oval, glänzend farmoisin, Fleisch lachsroth, fest, sehr gewürzreich frühreifend, volltragend, 1. Rang.

White Pine Apple. Frucht groß, rund, reinweiß, rosa angehaucht, Fleisch reinweiß, schmelzend, sehr gewürzreich, volltragend, frühreifend.

1 Dutzend 50 Pfg.

Alpha (Dr. Roden). Frucht groß, lebhaft roth, Fleisch fest, blaßroth, schmelzend von erhabenem Geschmack, Buchs niedrig, die frühesten von den großfrüchtigen, zum Treiben vorzüglich.

Auguste Nicaise (Dr. Nicaise 1872) Frucht sehr groß, herzförmig, scharlachroth, Fleisch dunkellachsfarben, gewürzreich, ausgeprägter Aprikosengeschmack, mittelfrüh.

Belle Bretonne (Boisselot). Frucht sehr groß, abgestumpft kegelförmig oder gelappt, glänzend roth, Fleisch rosa, fest, schmelzend, sehr gewürzreich, reichtragend.

Belle Canchoise (Acher mittelfrüh) Frucht groß, oval, kirschroth, Fleisch rosa, von vorzüglichem Wohlgeschmack, sehr reichtragend.

Deutscher Held (Goeschke). Frucht groß, schmelzend, von aromatischen, mild weinsäuerlichem Geschmack, glänzend dunkelroth, Fleisch blutroth, einzelne Stiele mit 10 - 12 ausgebildeten Früchten.

Deutsche Perle (Goeschke 1879). Frucht weiß mit rosa Anhauch, Gestalt glockenförmig, sehr aromatisch, reichtragend und frühreifend.

Director Fürer (Goethe). Frucht sehr groß, bohnenkammförmig, hellrosa, Fleisch weiß, angenehm säuerlich mit erhabenem Ananas-Geschmack, reichtragend, spätreifend.

Duc d'Edinbourg (1878). Amerikanische Züchtung, nebst Great American die größte Erdbeere, 7 Früchte wogen $\frac{1}{2}$ Kilo, festes aromatisches Fleisch, extra zur Massenkultur zu empfehlen.

Eugen Fürst (Goeschke). Frucht groß, dunkelschwarzbraun, Geschmack süß und saftig, Buchs niedrig, kräftig, sehr fruchtbar, mittelfrüh.

Helene Gloede (Gloede f. 1870). Frucht sehr groß, viereckig, bohnenkammförmig, orangeroth, Fleisch reinweiß, fest, süß, erhabener Geschmack, reichtragend, sehr spätreifend.

Helene Mulie vorzüglich.

Helvetia (Goeschke 1879). Frucht lang, lebhaft zinnoberroth, Fleisch weiß, sehr aromatisch, reichtragend und mittelfrüh.

James Veitch (Gloede). Frucht sehr groß, herzförmig, lebhaft zinnoberroth, Fleisch rosa, gewürzhaft mit ausgeprägtem Aprikosengeschmack, reichtragend, frühreifend.

La bonne Aimée Frucht groß, roth, reichtragend, von vorzüglichem Geschmack, 1. Rang.

- Monseigneur Dupanloup. Frucht sehr groß, konisch, glänzend roth, Fleisch blaß rosa, sehr saftig und aromatisch, ziemlich spätreifend, lange haltbar.
- Monseigneur Fournier (Boisselot 1876). Frucht sehr groß, von veränderlicher gelappter Gestalt, dunkelweinroth, Fleisch dunkelroth, sehr saftig, weinig, sehr spät.
- Marschal Mac-Mahon (Mulié 1876). Frucht sehr groß, die ersten breit, die späteren herzförmig, glänzend zinnoberroth, Fleisch rosa, fest, süß, sehr reichtragend.
- Phénomène (Ch. Delahousse). Frucht sehr groß, hellkarmin, in 2 oder 3 Lappen gespalten, Fleisch weißrosa, süß, Pflanze robust, früh und reichtragend.
- Professor Burvenich (Ch. Delahousse). Frucht groß, rundlich, hahnenkammförmig, dunkelroth lackglänzend, Fleisch dunkelrosa, zuckerig, sehr fruchtbar, mittelfrüh.
- Professor Pynaert (Ch. Delahousse). Frucht außerordentlich groß, hahnenkammförmig gelappt, schön roth, Fleisch weißrosa, saftig, von mittlerer Reifezeit.
- Pronty's Seedling. Frucht sehr groß, reichtragend, empfehlenswerthe Neuheit.
- Rudolf Goethe (Goeschke). Frucht groß, abgerundet, hellzinnoberrosa, Spitze weißlich, Fleisch weiß, köstlich aromatisch, fruchtbar, mittelfrüh.
- Sieger von Würth (Goeschke). Frucht sehr groß, stumpf kegelförmig, glänzend zinnoberroth, Fleisch rosa, gewürzreich, früh, reichtragend.
- Theodore Mulié (Ch. Delahousse). Frucht sehr groß, karminroth, Fleisch dunkelrosa, sehr saftig und wohlgeschmeckend, frühreifend, Markfrucht.
- Triomphe d' Orléans.

1 Dutzend 1 Mark.

- Duncan, Frucht groß, dunkelroth I. Rang.
- Königin Marie Henriette (Pr. Pynaert). Frucht groß, soll als Treiberdbeere alle übertreffen.
- Professor Liebig (Goeschke). Frucht sehr groß, oval, glänzend roth, Fleisch rosa, gewürzreich, an Moschuerdbeeren erinnernd, sehr reichtragend, mittelfrüh, Fleisch fest, unempfindlich gegen Witterungseinflüsse.

2 Stück 50 Pf.

- Gräfin Schaffgotsch (Goeschke 1879). Frucht sehr groß, oval, glänzend zinnoberroth, Fleisch weiß, sehr gewürzreich, mittelfrüh, lange ausbauern, reichtragend.
- Great American (Durand 1879). Amerikanische Züchtung, Riesenerdbeere, einzelne Früchte wiegen 100 Gramm bei 8 Zoll (20 Centm.) Umfang, glänzend dunkelroth, spät.
- Juliette (Lapierre 1878). Frucht ansehnlich groß, sehr spät reifend, glänzend hellroth, Geschmack ausgezeichnet, ungemein fruchtbar. Der Züchter hat der Pariser Zentral-Gesellschaft eine Pflanze mit 240 gut ausgebildeten Früchten vorgelegt.
- König Albert von Sachsen (Goeschke 1879). Frucht enorm groß, von breiter abgerundeter Form, glänzend kirchroth, sehr fruchtbar, viele Ausläufer treiben noch Bütteln und liefern im August eine zweite Ernte, mittelfrüh.

2. Monats-Erdbbeeren.

Fragaria semperflorens.

1 Dutzend 50 Pf.

- Belle de Montrouge (Lapierre). Früchte verhältnismäßig sehr groß und sehr reichtragend, von Anfang Juni bis zu den Herbstfrösten Früchte liefernd, Fruchtstiele sehr verzweigt und aufrecht stehend, Kelchblätter blattartig erweitert, interessant, Früchte schön und von guter Qualität.
- Deutscher Schütz (Busse). Frucht dunkelroth, dunkelste Monatserdbeere, Fleisch roth, sehr gewürzreich von feinem Aroma.
- Gewöhnliche Monatserdbeeren pro Hundert 1 Mark: Rothfrüchtige mit sowie auch ohne Ranken, weißfrüchtige mit sowie auch ohne Ranken.

3. Scharlach-Erdbeeren.

Fragaria virginica.

100 Stück 1 Mark.

May Queen (Nicholson). Frucht mittelgroß, orange zinnoberroth, sehr süß und gewürzhalt, Pflanze kräftig, sehr tragbar, die früheste aller bis jetzt bekannten Erdbeeren, vorzügliche Treiberdbeere.

4. Chili-Erdbeeren.

Fragaria chilensis.

Verlangen zur Ausbildung der Früchte reichliches Begießen und einen leichten mit Haideerde vermischten Boden, im Winter leichte Schutzbede von Tannenreisig.

Jeanne Hachette (Gloede). Frucht groß, abgestumpft, konisch, blaßrosa, Fleisch schneeweiß, sehr gewürzreich, reichtragend, spätreifend.

Lucida perfecta (Gloede). Frucht groß, rund, orangefarb, Fleisch weiß, süß, etwas weinsäuerlich, ausgezeichnet gewürzreich, mittelfrüh oder spät, Blätter glänzend.

ya 466 s

Verlag von Wiegandt, Hempel & Parey in Berlin, S.W., 91 Zimmerstr.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung und Postanstalt.

DEUTSCHER GARTEN

Monatsschrift für Gärtner und Gartenfreunde.

Unter Mitwirkung
zahlreicher Fachmänner aus Wissenschaft und Praxis
herausgegeben von

Dr. C. BOLLE,

Zweiter Vors. d. Vereins zur Beförd. d. Gartenbaues in d. Kgl. Pr. Staaten

Mit zahlreichen Holzschnitten und Farbendrucktafeln.

Probehefte liefert die Verlagshandlung gratis u. franco.

Mit zahlreichen Holzschnitten und Farbendrucktafeln.

Preis für den Jahrgang von 12 Heften mit Farbendrucktafeln 20 Mk.

Gärtnerische Werke,
welche wir
auf Wunsch für unsere werthen Geschäftsfreunde gern bereit sind zu
besorgen.

Verlag von Wiegand Hempel & Sarey, Berlin.

Deutsche Pomologie.

Chromolithographische
Abbildung, Beschreibung und Kulturanweisung der empfehlenswerthesten
Sorten Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Pfirsiche und Weintrauben.

Nach den Ermittlungen des Deutschen Pomologen-Vereins
herausgegeben von

W. Lauche,

Königlicher Garten-Inspector zu Potsdam.

Die Ausgabe des Werkes geschieht in monatlichen Heften von 4 Farbendruckbildern
nebst dazu gehörigem Text und wird in 4 Jahren vollendet sein.

Preis der Lieferung 2 Mark.

Deutsche Dendrologie

von

W. Lauche.

Systematische Uebersicht, Beschreibung, Kulturanweisung und Verwendung
der in Deutschland ohne oder mit Decke aushaltenden Gehölze.

Mit 283 Holzschnitten. 20 Mk. Gebunden 22,50 Mk.

Handbuch des Gärtnerischen Planzeichnens.

Von **G. Eichler.**

Mit 18 Chromolithographien und 125 in den Text gedruckten Holzschnitten.

In Quartformat. Preis in Leinen gebunden 14 Mark.

Verlag von Carl Wilffersodt, Leipzig.

Die Praktische Messkunst und Mathematik für Gärtner, Landwirthe etc.

von W. Legeler.

Dritte verbesserte und umgearbeitete Auflage, mit 240 Holzschnitten.

Herausgegeben

von **G. Eichler.**

Preis in Leinen gebunden 6,80 Mark.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 international (C BY-ND 4.0)